

Tabelas do Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis

Brasil, 17 capitais e Distrito Federal 2002-2005



Secretaria de
Vigilância em Saúde

Ministério
da Saúde

Tabela 4.1. Distribuição da população de estudo por sexo, faixa etária e escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Sexo				Faixa etária						Escolaridade - Ensino fundamental			
	Masculino		Feminino		15 a 24 anos		25 a 49 anos		50 anos e mais		incompleto		completo e mais	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Manaus	766	45,0	938	55,0	536	31,5	902	52,9	266	15,6	732	43,3	959	56,7
Belém	599	42,5	811	57,5	431	30,6	708	50,2	271	19,2	566	40,3	839	59,7
Palmas	601	48,7	633	51,3	423	34,3	687	55,7	124	10,1	394	32,5	819	67,5
São Luís	754	43,5	979	56,5	574	32,6	877	50,6	282	16,3	562	32,6	1163	67,4
Fortaleza	1001	44,2	1266	55,8	647	28,5	1116	49,2	504	22,2	982	43,8	1258	56,2
Natal	352	43,5	458	56,5	240	29,6	396	48,9	174	21,5	383	48,9	400	51,1
João Pessoa	490	40,7	715	59,3	319	26,5	619	51,4	267	22,2	555	46,4	642	53,6
Recife	436	43,1	576	56,9	248	24,5	497	49,1	267	26,4	429	44,2	541	55,8
Aracaju	354	41,9	490	58,1	249	29,5	430	50,9	165	19,5	361	43,6	467	56,4
Belo Horizonte	985	43,7	1270	56,3	563	25,0	1187	52,6	505	22,4	915	41,4	1297	58,6
Vitória	354	46,0	416	54,0	199	25,8	378	49,1	193	25,1	198	26,3	556	73,7
Rio de Janeiro	1096	40,7	1596	59,3	537	19,9	1302	48,4	853	31,7	789	30,0	1844	70,0
São Paulo	525	43,4	686	56,6	326	26,9	614	50,7	271	22,4	452	38,5	723	61,5
Curitiba	1045	44,7	1292	55,3	562	24,0	1266	54,2	509	21,8	737	33,0	1496	67,0
Florianópolis	379	44,5	472	55,5	194	22,8	414	48,6	243	28,6	264	32,1	559	67,9
Porto Alegre	619	44,3	777	55,7	320	22,9	663	47,5	413	29,6	426	30,9	953	69,1
Campo Grande	308	44,2	389	55,8	206	29,6	332	47,6	159	22,8	256	38,5	409	61,5
Distrito Federal	866	43,4	1130	56,6	598	30,0	1041	52,2	357	17,9	707	35,9	1260	64,1

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: * Sobre alguns indivíduos não foi obtida esta informação.

Tabela 5.1. Percentual de fumantes regulares de cigarros na população de estudo de 15 anos ou mais, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo								Razão M/F
					Masculino				Feminino				
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	
Manaus	1703	298	17,5	(15,5-19,5)	765	185	24,2	(21,1-27,3)	938	113	12,0	(10,1-14,0)	2,0
Belém	1410	225	16,0	(13,4-18,6)	599	133	22,2	(18,6-25,8)	811	92	11,3	(8,7-14,0)	2,0
Palmas	1234	199	16,1	(13,6-18,6)	601	119	19,8	(15,9-23,7)	633	80	12,6	(10,2-15,1)	1,6
São Luís	1733	253	14,6	(12,7-16,5)	754	158	21,0	(17,7-24,2)	979	95	9,7	(7,6-11,8)	2,2
Fortaleza	2266	418	18,4	(16,6-20,3)	1001	239	23,9	(20,9-26,8)	1265	179	14,2	(12,3-16,0)	1,7
Natal	810	119	14,7	(12,1-17,3)	352	63	17,9	(14,1-21,7)	458	56	12,2	(9,2-15,2)	1,5
João Pessoa	1205	201	16,7	(14,0-19,3)	490	115	23,5	(19,3-27,6)	715	86	12,0	(9,4-14,6)	2,0
Recife	1010	176	17,4	(14,8-20,1)	434	95	21,9	(18,0-25,7)	576	81	14,1	(11,2-16,9)	1,6
Aracaju	843	109	12,9	(10,4-15,4)	354	60	16,9	(13,0-20,9)	489	49 ⁺	10,0	(7,3-12,8)	1,7
Belo Horizonte	2255	459	20,4	(18,4-22,3)	985	257	26,1	(23,0-29,1)	1270	202	15,9	(13,8-18,0)	1,6
Vitória	768	137	17,8	(14,6-21,1)	354	74	20,9	(16,0-25,8)	414	63	15,2	(11,6-18,8)	1,4
Rio de Janeiro	2692	470	17,5	(15,8-19,1)	1096	217	19,8	(17,3-22,3)	1596	253	15,9	(13,9-17,9)	1,2
São Paulo	1210	241	19,9	(17,5-22,3)	524	121	23,1	(19,3-26,8)	686	120	17,5	(14,1-20,8)	1,3
Curitiba	2337	502	21,5	(19,5-23,4)	1045	253	24,2	(21,3-27,2)	1292	249	19,3	(17,0-21,5)	1,3
Florianópolis	851	182	21,4	(17,9-24,9)	379	93	24,5	(19,7-29,3)	472	89	18,9	(14,6-23,2)	1,3
Porto Alegre	1395	352	25,2	(22,4-28,1)	618	174	28,2	(24,1-32,2)	777	178	22,9	(19,7-26,1)	1,2
Campo Grande	697	101	14,5	(11,4-17,6)	308	60	19,5	(14,4-24,6)	389	41 ⁺	10,5	(7,2-13,8)	1,9
Distrito Federal	1995	345	17,3	(15,4-19,2)	866	180	20,8	(17,1-24,4)	1129	165	14,6	(12,6-16,7)	1,4

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como fumantes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 5.2. Percentual de fumantes regulares de cigarros na população de estudo de 15 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária								Razão 25 ou+/15-24
	15 a 24 anos				25 anos e mais				
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	
Manaus	535	68	12,7	(9,7-15,7)	1168	230	19,7	(17,5-21,9)	1,6
Belém	431	44 ⁺	10,2	(6,8-13,6)	979	181	18,5	(15,3-21,7)	1,8
Palmas	423	46 ⁺	10,9	(7,8-14,0)	811	153	18,9	(15,8-22,0)	0,6
São Luís	574	67	11,7	(8,5-14,8)	1159	186	16,0	(13,9-18,2)	1,4
Fortaleza	646	79	12,2	(9,3-15,2)	1620	339	20,9	(18,7-23,1)	1,7
Natal	240	24 ⁺	10,0	(6,1-13,9)	570	95	16,7	(13,6-19,7)	1,7
João Pessoa	319	33 ⁺	10,3	(6,3-14,4)	886	168	19,0	(15,9-22,0)	1,8
Recife	248	20 ⁺	8,1	(3,7-12,4)	762	156	20,5	(17,2-23,7)	2,5
Aracaju	249	17 ⁺	6,8	(3,1-10,5)	594	92	15,5	(12,3-18,6)	2,3
Belo Horizonte	563	66	11,7	(8,5-14,9)	1692	393	23,2	(20,9-25,5)	2,0
Vitória	199	33 ⁺	16,6	(10,1-23,0)	569	104	18,3	(14,8-21,7)	1,1
Rio de Janeiro	537	38 ⁺	7,1	(4,8-9,3)	2155	432	20,0	(18,1-22,0)	2,8
São Paulo	326	47 ⁺	14,4	(10,3-18,6)	884	194	21,9	(19,1-24,8)	1,5
Curitiba	562	107	19,0	(15,4-22,7)	1775	395	22,3	(20,1-24,4)	1,2
Florianópolis	194	30 ⁺	15,5	(10,2-20,7)	657	152	23,1	(19,1-27,2)	1,5
Porto Alegre	320	77	24,1	(18,4-29,7)	1075	275	25,6	(22,5-28,6)	1,1
Campo Grande	206	32 ⁺	15,5	(10,2-20,8)	491	69	14,1	(10,9-17,2)	0,9
Distrito Federal	597	75	12,6	(10,2-14,9)	1398	270	19,3	(17,0-21,6)	1,5

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como fumantes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 5.3. Percentual de fumantes regulares de cigarros na população de estudo de 15 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental								Razão incompleto/ completo e+
	incompleto				completo e mais				
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	
Manaus	731	166	22,7	(20,0-25,4)	959	126	13,1	(10,9-15,4)	1,7
Belém	566	130	23,0	(18,8-27,1)	839	94	11,2	(8,8-13,6)	2,1
Palmas	394	92	23,4	(19,5-27,2)	819	103	12,6	(9,9-15,2)	1,9
São Luís	562	116	20,6	(16,8-24,4)	1163	136	11,7	(9,6-13,8)	1,8
Fortaleza	981	245	25,0	(21,8-28,2)	1258	172	13,7	(11,9-15,4)	1,8
Natal	383	80	20,9	(16,9-24,8)	400	37 ⁺	9,3	(6,5-12,0)	2,2
João Pessoa	555	125	22,5	(18,8-26,2)	642	75	11,7	(9,0-14,4)	1,9
Recife	427	110	25,8	(22,0-29,5)	541	62	11,5	(8,8-14,1)	2,2
Aracaju	361	71	19,7	(14,9-24,4)	467	37 ⁺	7,9	(5,4-10,4)	2,5
Belo Horizonte	915	222	24,3	(20,9-27,7)	1297	230	17,7	(15,4-20,0)	1,4
Vitória	196	47 ⁺	24,0	(18,7-29,2)	556	89	16,0	(12,1-19,9)	1,5
Rio de Janeiro	789	152	19,3	(16,5-22,0)	1844	312	16,9	(15,0-18,8)	1,1
São Paulo	452	101	22,3	(18,2-26,5)	722	133	18,4	(15,5-21,3)	1,2
Curitiba	737	202	27,4	(23,9-30,9)	1496	283	18,9	(16,6-21,3)	1,4
Florianópolis	264	70	26,5	(19,6-33,4)	559	105	18,8	(15,2-22,3)	1,4
Porto Alegre	426	141	33,1	(28,3-37,9)	952	207	21,7	(19,0-24,5)	1,5
Campo Grande	256	43 ⁺	16,8	(12,2-21,4)	409	48 ⁺	11,7	(8,6-14,9)	1,4
Distrito Federal	707	163	23,1	(19,9-26,2)	1259	177	14,1	(12,2-15,9)	1,6

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como fumantes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 5.4. Percentual de não-fumantes expostos à poluição tabagística ambiental dentro do domicílio, na população de estudo de 15 anos ou mais, por faixa etária e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Faixa etária							
					15 a 24 anos				25 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1405	316	22,5	(18,1-26,9)	467	140	30,0	(24,0-35,9)	938	176	18,8	(14,5-23,0)
Belém	1185	252	21,3	(17,2-25,3)	387	110	28,4	(22,2-34,7)	798	142	17,8	(14,1-21,5)
Palmas	1035	196	18,9	(15,1-22,8)	377	93	24,7	(18,7-30,6)	658	103	15,7	(12,2-19,1)
São Luís	1480	265	17,9	(14,5-21,3)	507	138	27,2	(21,6-32,8)	973	127	13,1	(10,5-15,7)
Fortaleza	1844	433	23,5	(20,0-27,0)	564	182	32,3	(27,1-37,5)	1280	251	19,6	(16,4-22,8)
Natal	691	171	24,7	(19,7-29,8)	216	79	36,6	(28,2-44,9)	475	92	19,4	(14,3-24,4)
João Pessoa	1004	223	22,2	(16,9-27,5)	286	91	31,8	(22,6-41,0)	718	132	18,4	(13,6-23,2)
Recife	834	196	23,5	(18,7-28,3)	228	81	35,5	(27,6-43,5)	606	115	19,0	(14,7-23,3)
Aracaju	734	121	16,5	(12,8-20,2)	232	46 ⁺	19,8	(13,9-25,8)	502	75	14,9	(11,1-18,8)
Belo Horizonte	1796	355	19,8	(16,9-22,6)	497	145	29,2	(23,8-34,6)	1299	210	16,2	(13,8-18,6)
Vitória	631	93	14,7	(11,0-18,5)	166	34 ⁺	20,5	(12,8-28,1)	465	59	12,7	(9,5-15,9)
Rio de Janeiro	2222	361	16,2	(14,3-18,2)	499	130	26,1	(21,9-30,2)	1723	231	13,4	(11,6-15,2)
São Paulo	969	192	19,8	(16,4-23,3)	279	85	30,5	(24,2-36,7)	690	107	15,5	(12,5-18,5)
Curitiba	1835	269	14,7	(12,4-17,0)	455	119	26,2	(21,1-31,2)	1380	150	10,9	(8,9-12,8)
Florianópolis	669	113	16,9	(12,5-21,2)	164	48 ⁺	29,3	(19,9-38,6)	505	65	12,9	(9,0-16,8)
Porto Alegre	1043	196	18,8	(14,9-22,6)	243	87	35,8	(27,3-44,3)	800	109	13,6	(10,7-16,5)
Campo Grande	596	61	10,2	(6,7-13,8)	174	25 ⁺	14,4	(7,8-21,0)	422	36 ⁺	8,5	(5,3-11,8)
Distrito Federal	1650	266	16,1	(12,9-19,3)	522	128	24,5	(18,5-30,5)	1128	138	12,2	(9,6-14,9)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como não fumantes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 5.5. Cessação do tabagismo (ex-fumantes/fumantes + ex-fumantes) na população de estudo de 15 anos ou mais, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	549	251	45,7	(41,5-50,0)	324	139	42,9	(37,1-48,7)	225	112	49,8	(42,9-56,7)
Belém	449	224	49,9	(44,0-55,8)	256	123	48,0	(41,7-54,4)	193	101	52,3	(44,7-60,0)
Palmas	386	187	48,4	(43,2-53,7)	237	118	49,8	(43,5-56,1)	149	69	46,3	(37,3-55,3)
São Luís	463	210	45,4	(38,9-51,8)	280	122	43,6	(36,3-50,8)	183	88	48,1	(39,2-57,0)
Fortaleza	810	391	48,3	(44,3-52,3)	449	210	46,8	(41,7-51,8)	360	181	50,3	(45,4-55,1)
Natal	240	121	50,4	(42,7-58,1)	131	68	51,9	(42,2-61,6)	109	53	48,6	(38,7-58,5)
João Pessoa	359	158	44,0	(37,3-50,7)	195	80	41,0	(33,1-49,0)	164	78	47,6	(39,3-55,8)
Recife	344	168	48,8	(42,8-54,8)	189	94	49,7	(42,1-57,3)	155	74	47,7	(39,4-56,1)
Aracaju	222	113	50,9	(43,4-58,4)	118	58	49,2	(39,8-58,5)	104	55	52,9	(42,4-63,4)
Belo Horizonte	928	469	50,5	(46,8-54,3)	497	240	48,3	(43,7-52,9)	431	229	53,1	(48,3-58,0)
Vitória	285	148	51,9	(44,9-59,0)	167	93	55,7	(46,9-64,5)	118	55	46,6	(36,8-56,4)
Rio de Janeiro	1020	551	54,0	(50,4-57,6)	513	296	57,7	(53,1-62,3)	508	255	50,2	(45,7-54,7)
São Paulo	480	239	49,8	(44,4-55,2)	245	124	50,6	(43,4-57,8)	235	115	48,9	(41,9-56,0)
Curitiba	925	423	45,7	(42,4-49,0)	493	240	48,7	(44,4-53,0)	432	183	42,4	(37,9-46,8)
Florianópolis	341	159	46,6	(40,2-53,0)	188	95	50,5	(43,0-58,1)	153	64	41,8	(33,9-49,7)
Porto Alegre	658	306	46,5	(42,4-50,6)	340	166	48,8	(43,3-54,4)	318	140	44,0	(38,8-49,2)
Campo Grande	242	141	58,3	(52,1-64,4)	141	81	57,4	(49,7-65,2)	101	60	59,4	(50,3-68,5)
Distrito Federal	696	351	50,4	(46,5-54,4)	361	181	50,1	(44,0-56,3)	335	170	50,7	(46,2-55,3)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 5.6. Cessação do tabagismo (ex-fumantes/fumantes + ex-fumantes) na população de estudo de 15 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	315	149	47,3	(41,4-53,3)	224	98	43,8	(37,2-50,3)
Belém	236	106	44,9	(38,4-51,4)	212	118	55,7	(47,5-63,8)
Palmas	177	85	48,0	(40,6-55,5)	202	99	49,0	(42,4-55,6)
São Luís	203	87	42,9	(33,5-52,2)	258	122	47,3	(38,7-55,9)
Fortaleza	439	194	44,2	(38,5-49,9)	367	195	53,1	(48,4-57,8)
Natal	147	67	45,6	(36,3-54,8)	85	48 ⁺	56,5	(46,6-66,4)
João Pessoa	209	84	40,2	(33,2-47,2)	148	73	49,3	(39,3-59,3)
Recife	181	71	39,2	(32,5-45,9)	150	88	58,7	(50,0-67,3)
Aracaju	130	59	45,4	(35,5-55,2)	88	51	58,0	(48,2-67,7)
Belo Horizonte	437	215	49,2	(44,1-54,3)	475	245	51,6	(46,4-56,7)
Vitória	92	45 ⁺	48,9	(37,6-60,2)	186	97	52,2	(43,4-60,9)
Rio de Janeiro	319	167	52,4	(46,7-58,0)	680	368	54,1	(49,9-58,3)
São Paulo	208	107	51,4	(44,2-58,7)	254	121	47,6	(40,4-54,9)
Curitiba	347	145	41,8	(36,3-47,3)	539	256	47,5	(43,0-52,0)
Florianópolis	119	49 ⁺	41,2	(30,1-52,2)	212	107	50,5	(42,9-58,0)
Porto Alegre	230	89	38,7	(33,6-43,8)	415	208	50,1	(45,3-55,0)
Campo Grande	104	61	58,7	(49,8-67,5)	123	75	61,0	(52,6-69,4)
Distrito Federal	307	144	46,9	(40,7-53,1)	379	202	53,3	(48,8-57,8)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como ex-fumantes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 5.7. Distribuição dos fumantes regulares na população de estudo de 15 anos ou mais, por idade de iniciação ao tabagismo, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de fumantes regulares ^a	Faixa etária					
		5 a 19 anos			20 a 55 anos		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	288	201	69,8	(64,0-75,6)	87	30,2	(24,4-36,0)
Belém	219	156	71,2	(65,8-76,6)	63	28,8	(23,4-34,2)
Palmas	191	128	67,0	(59,3-74,7)	63	33,0	(25,3-40,7)
São Luís	240	173	72,1	(65,6-78,6)	67	27,9	(21,4-34,4)
Fortaleza	415	308	74,2	(69,8-78,6)	107	25,8	(21,4-30,2)
Natal	112	71	63,4	(53,3-73,5)	41 ⁺	36,6	(26,5-46,7)
João Pessoa	196	143	73,0	(66,0-79,9)	53	27,0	(20,1-34,0)
Recife	166	116	69,9	(62,0-77,7)	50	30,1	(22,3-38,0)
Aracaju	101	71	70,3	(58,6-82,0)	30 ⁺	29,7	(18,0-41,4)
Belo Horizonte	455	320	70,3	(66,2-74,5)	135	29,7	(25,5-33,8)
Vitória	137	94	68,6	(60,0-77,3)	43 ⁺	31,4	(22,7-40,0)
Rio de Janeiro	466	302	64,8	(59,7-69,9)	164	35,2	(30,1-40,3)
São Paulo	233	163	70,0	(64,3-75,6)	70	30,0	(24,4-35,7)
Curitiba	497	351	70,6	(66,7-74,6)	146	29,4	(25,4-33,3)
Florianópolis	180	124	68,9	(61,4-76,4)	56	31,1	(23,6-38,6)
Porto Alegre	349	246	70,5	(65,1-75,9)	103	29,5	(24,1-34,9)
Campo Grande	99	69	69,7	(61,7-77,7)	30 ⁺	30,3	(22,3-38,3)
Distrito Federal	340	215	63,2	(58,4-68,1)	125	36,8	(31,9-41,6)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como fumantes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

^a Total de fumantes regulares cuja informação de idade de iniciação ao tabagismo foi registrada.

Tabela 5.8. Distribuição de fumantes por número de cigarros fumados em média ao dia, na população de estudo de 15 anos ou mais, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de fumantes	Número de cigarros fumados por dia								
		1 a 10 cigarros/dia			11 a 20 cigarros/dia			21 cigarros ou mais/dia		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	226	150	66,4	(61,0-71,7)	65	28,8	(23,5-34,0)	11 ⁺	4,9	(2,6-7,2)
Belém	168	109	64,9	(58,8-71,0)	50	29,8	(23,6-35,9)	9 ⁺	5,4	(1,8-8,9)
Palmas	163	84	51,5	(42,1-60,9)	59	36,2	(28,6-44,5)	20 ⁺	12,3	(7,4-19,6)
São Luís	190	96	50,5	(43,3-57,7)	76	40,0	(32,7-47,8)	18 ⁺	9,5	(6,0-14,8)
Fortaleza	333	191	57,4	(51,1-63,6)	123	36,9	(30,9-43,0)	19 ⁺	5,7	(3,4-8,0)
Natal	111	54	48,6	(39,3-57,9)	43 ⁺	38,7	(29,0-48,5)	14 ⁺	12,6	(7,0-18,1)
João Pessoa	175	95	54,3	(44,9-63,7)	70	40,0	(31,5-48,5)	10 ⁺	5,7	(2,1-9,3)
Recife	149	73	49,0	(42,1-55,9)	58	38,9	(31,9-45,9)	18 ⁺	12,1	(6,2-18,0)
Aracaju	96	53	55,2	(46,4-64,0)	35 ⁺	36,5	(27,0-45,9)	8 ⁺	8,3	(3,5-13,1)
Belo Horizonte	408	191	46,8	(41,7-51,9)	180	44,1	(38,9-49,3)	37 ⁺	9,1	(6,1-12,1)
Vitória	107	47 ⁺	43,9	(34,7-53,1)	50	46,7	(36,3-57,1)	10 ⁺	9,3	(3,9-14,8)
Rio de Janeiro	417	163	39,1	(33,9-44,3)	196	47,0	(42,0-52,0)	58	13,9	(10,3-17,5)
São Paulo	227	98	43,2	(35,8-50,5)	104	45,8	(38,6-53,0)	25 ⁺	11,0	(7,0-15,0)
Curitiba	456	203	44,5	(39,7-49,4)	203	44,5	(39,5-49,6)	50	11,0	(7,3-14,6)
Florianópolis	158	61	38,6	(29,4-47,8)	81	51,3	(43,2-59,3)	16 ⁺	10,1	(5,5-14,7)
Porto Alegre	315	122	38,7	(32,7-44,8)	152	48,2	(42,0-54,5)	41 ⁺	13,0	(8,7-17,3)
Campo Grande	92	36 ⁺	39,1	(29,4-48,9)	40 ⁺	43,5	(32,2-54,8)	16 ⁺	17,4	(10,4-24,4)
Distrito Federal	297	169	57,0	(50,6-63,2)	104	35,0	(29,2-40,9)	24 ⁺	8,0	(4,9-11,2)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como fumantes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 6.2. Prevalência de sobrepeso, obesidade e excesso de peso na população de estudo de 15 anos ou mais, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total	Sobrepeso			Obesidade			Excesso de peso		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	1314	384	29,2	(26,4-32,1)	129	9,8	(8,2-11,5)	513	39,0	(35,9-42,2)
Belém	970	256	26,4	(23,5-29,2)	84	8,7	(6,6-10,7)	340	35,1	(31,3-38,8)
Palmas	1021	250	24,5	(21,9-27,0)	68	6,7	(5,3-8,0)	318	31,1	(28,2-34,1)
São Luís	1217	280	23,0	(20,8-25,2)	83	6,8	(5,4-8,2)	363	29,8	(27,0-32,6)
Fortaleza	1747	510	29,2	(27,0-31,4)	167	9,6	(8,1-11,0)	677	38,8	(36,5-41,0)
Natal	639	147	23,0	(19,8-26,2)	68	10,6	(7,8-13,5)	215	33,6	(29,6-37,7)
João Pessoa	925	249	26,9	(23,7-30,2)	93	10,1	(8,1-12,0)	342	37,0	(33,5-40,5)
Recife	806	231	28,7	(25,9-31,5)	95	11,8	(9,5-14,1)	326	40,4	(36,8-44,1)
Aracaju	667	163	24,4	(21,1-27,8)	54	8,1	(5,5-10,6)	217	32,5	(28,8-36,3)
Belo Horizonte	1894	528	27,9	(25,8-30,0)	177	9,3	(8,0-10,7)	705	37,2	(34,8-39,6)
Vitória	694	203	29,3	(25,5-33,0)	57	8,2	(6,2-10,2)	260	37,5	(33,5-41,5)
Rio de Janeiro	2340	783	33,5	(31,7-35,2)	302	12,9	(11,3-14,5)	1085	46,4	(44,4-48,3)
São Paulo	1080	317	29,4	(26,4-32,3)	126	11,7	(9,5-13,8)	443	41,0	(37,8-44,3)
Curitiba	2191	655	29,9	(28,0-31,8)	238	10,9	(9,5-12,2)	893	40,8	(38,5-43,0)
Florianópolis	785	220	28,0	(24,4-31,6)	83	10,6	(8,5-12,7)	303	38,6	(34,7-42,5)
Porto Alegre	1339	413	30,8	(28,5-33,1)	164	12,2	(10,4-14,1)	577	43,1	(40,4-45,8)
Campo Grande	625	162	25,9	(22,5-29,4)	69	11,0	(8,4-13,7)	231	37,0	(32,8-41,1)
Distrito Federal	1748	444	25,4	(23,5-27,3)	152	8,7	(7,3-10,1)	596	34,1	(31,8-36,4)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: * $25 \text{ kg/m}^2 \leq \text{IMC} < 30 \text{ kg/m}^2$

** $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$

*** $\text{IMC} \geq 25 \text{ kg/m}^2$

Tabela 6.3. Prevalência de sobrepeso, obesidade e excesso de peso na população de estudo de 15 anos ou mais, por sexo, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Sexo	Total	Sobrepeso			Obesidade			Excesso de peso		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	Masculino	675	235	34,8	(30,8-38,8)	72	10,7	(8,2-13,2)	307	45,5	(41,1-49,9)
	Feminino	639	149	23,3	(19,8-26,8)	57	8,9	(6,5-11,4)	206	32,2	(28,0-36,5)
Belém	Masculino	486	148	30,5	(26,2-34,7)	44 ⁺	9,1	(6,2-11,9)	192	39,5	(34,1-44,9)
	Feminino	484	108	22,3	(18,8-25,8)	40 ⁺	8,3	(5,8-10,8)	148	30,6	(26,8-34,4)
São Luís	Masculino	607	164	27,0	(23,3-30,7)	47 ⁺	7,7	(5,4-10,1)	211	34,8	(30,5-39,0)
	Feminino	610	116	19,0	(16,1-22,0)	36 ⁺	5,9	(4,0-7,8)	152	24,9	(21,7-28,2)
Palmas	Masculino	540	160	29,6	(26,6-32,7)	40 ⁺	7,4	(5,3-9,5)	200	37,0	(32,9-41,2)
	Feminino	481	90	18,7	(14,9-22,6)	28 ⁺	5,8	(3,7-7,9)	118	24,5	(19,9-29,1)
Fortaleza	Masculino	869	292	33,6	(29,9-37,3)	97	11,2	(9,0-13,4)	389	44,8	(40,8-48,8)
	Feminino	878	218	24,8	(22,2-27,5)	70	8,0	(6,2-9,7)	288	32,8	(29,9-35,7)
Natal	Masculino	317	80	25,2	(20,4-30,1)	36 ⁺	11,4	(7,2-15,6)	116	36,6	(30,7-42,5)
	Feminino	322	67	20,8	(17,2-24,4)	32 ⁺	9,9	(6,9-13,0)	99	30,7	(26,0-35,5)
João Pessoa	Masculino	429	141	32,9	(28,4-37,3)	46 ⁺	10,7	(7,4-14,0)	187	43,6	(39,0-48,2)
	Feminino	496	108	21,8	(17,6-26,0)	47 ⁺	9,5	(7,5-11,4)	155	31,3	(26,7-35,8)
Recife	Masculino	399	131	32,8	(28,6-37,1)	50	12,5	(9,0-16,1)	181	45,4	(40,5-50,2)
	Feminino	407	100	24,6	(20,2-29,0)	45 ⁺	11,1	(8,0-14,1)	145	35,6	(30,4-40,9)
Aracaju	Masculino	314	96	30,6	(25,4-35,7)	24 ⁺	7,6	(4,3-11,0)	120	38,2	(32,7-43,8)
	Feminino	353	67	19,0	(15,1-22,8)	30 ⁺	8,5	(5,1-11,9)	97	27,5	(23,4-31,5)
Belo Horizonte	Masculino	930	303	32,6	(29,5-35,6)	78	8,4	(6,4-10,4)	381	41,0	(37,5-44,4)
	Feminino	964	225	23,3	(20,7-26,0)	99	10,3	(8,5-12,0)	324	33,6	(30,7-36,5)
Vitória	Masculino	339	118	34,8	(29,0-40,7)	30 ⁺	8,8	(6,0-11,7)	148	43,7	(37,8-49,5)
	Feminino	355	85	23,9	(19,9-28,0)	27 ⁺	7,6	(4,9-10,4)	112	31,5	(26,7-36,4)
Rio de Janeiro	Masculino	1024	400	39,1	(36,2-41,9)	130	12,7	(10,6-14,8)	530	51,8	(48,9-54,6)
	Feminino	1316	383	29,1	(26,6-31,7)	172	13,1	(11,1-15,0)	555	42,2	(39,5-44,8)
São Paulo	Masculino	497	167	33,6	(29,2-38,0)	57	11,5	(8,6-14,4)	224	45,1	(40,5-49,7)
	Feminino	583	150	25,7	(22,0-29,4)	69	11,8	(8,8-14,8)	219	37,6	(33,4-41,7)
Curitiba	Masculino	1011	352	34,8	(32,2-37,5)	110	10,9	(8,7-13,1)	462	45,7	(42,6-48,8)
	Feminino	1180	303	25,7	(23,3-28,1)	128	10,8	(9,1-12,6)	431	36,5	(33,7-39,3)
Florianópolis	Masculino	359	121	33,7	(28,6-38,8)	36 ⁺	10,0	(6,9-13,1)	157	43,7	(38,2-49,2)
	Feminino	426	99	23,2	(19,1-27,4)	47 ⁺	11,0	(8,0-14,1)	146	34,3	(29,6-39,0)
Porto Alegre	Masculino	604	213	35,3	(32,1-38,5)	74	12,3	(9,8-14,7)	287	47,5	(43,8-51,2)
	Feminino	735	200	27,2	(24,2-30,2)	90	12,2	(9,9-14,6)	290	39,5	(35,8-43,1)
Campo Grande	Masculino	294	79	26,9	(20,9-32,8)	40 ⁺	13,6	(9,5-17,7)	119	40,5	(34,4-46,6)
	Feminino	331	83	25,1	(19,2-31,0)	29 ⁺	8,8	(5,7-11,8)	112	33,8	(27,7-39,9)
Distrito Federal	Masculino	821	246	30,0	(27,2-32,7)	72	8,8	(7,0-10,5)	318	38,7	(35,4-42,1)
	Feminino	927	198	21,4	(18,6-24,1)	80	8,6	(6,6-10,6)	278	30,0	(26,7-33,3)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como obesos nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

* $25 \text{ kg/m}^2 \leq \text{IMC} < 30 \text{ kg/m}^2$

** $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$

*** $\text{IMC} \geq 25 \text{ kg/m}^2$

Tabela 6.4. Prevalência de excesso de peso na população de estudo de 15 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	15 a 24 anos				25 a 49 anos				50 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	401	56	14,0	(10,3-17,6)	742	358	48,2	(44,2-52,3)	171	99	57,9	(48,4-67,4)
Belém	277	46 ⁺	16,6	(11,6-21,7)	529	216	40,8	(36,4-45,2)	164	78	47,6	(39,0-56,1)
Palmas	344	42 ⁺	12,2	(8,4-16,0)	581	219	37,7	(33,9-41,4)	96	57	59,4	(49,8-68,9)
São Luís	382	54	14,1	(10,3-18,0)	651	225	34,6	(31,2-37,9)	184	84	45,7	(38,0-53,3)
Fortaleza	487	97	19,9	(16,8-23,0)	903	378	41,9	(38,9-44,8)	357	202	56,6	(51,6-61,5)
Natal	186	21 ⁺	11,3	(7,1-15,5)	336	139	41,4	(35,6-47,2)	117	55	47,0	(37,0-57,0)
João Pessoa	254	50	19,7	(15,1-24,3)	483	199	41,2	(36,0-46,4)	188	93	49,5	(43,0-56,0)
Recife	193	36 ⁺	18,7	(12,7-24,7)	415	178	42,9	(38,0-47,8)	198	112	56,6	(49,1-64,0)
Aracaju	201	24 ⁺	11,9	(8,2-15,6)	352	130	36,9	(31,5-42,3)	114	63	55,3	(46,7-63,8)
Belo Horizonte	460	57	12,4	(9,2-15,6)	1031	433	42,0	(38,6-45,4)	403	215	53,3	(49,4-57,3)
Vitória	178	32 ⁺	18,0	(13,1-22,9)	342	148	43,3	(38,0-48,5)	174	80	46,0	(36,2-55,8)
Rio de Janeiro	440	103	23,4	(18,5-28,3)	1159	545	47,0	(43,7-50,3)	741	437	59,0	(55,8-62,1)
São Paulo	285	47 ⁺	16,5	(12,0-21,0)	566	256	45,2	(40,8-49,6)	229	140	61,1	(54,3-68,0)
Curitiba	511	75	14,7	(11,9-17,4)	1209	538	44,5	(41,4-47,6)	471	280	59,4	(54,5-64,4)
Florianópolis	171	27 ⁺	15,8	(9,3-22,3)	393	143	36,4	(31,3-41,5)	221	133	60,2	(54,8-65,5)
Porto Alegre	298	44 ⁺	14,8	(10,3-19,2)	640	306	47,8	(43,8-51,8)	401	227	56,6	(51,5-61,7)
Campo Grande	186	33 ⁺	17,7	(12,7-22,8)	302	125	41,4	(35,4-47,4)	137	73	53,3	(44,7-61,9)
Distrito Federal	517	67	13,0	(9,8-16,1)	935	358	38,3	(34,3-42,3)	296	171	57,8	(52,4-63,1)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados com excesso de peso nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

* $IMC \geq 25 \text{ kg/m}^2$

Tabela 6.5. Prevalência de sobrepeso, obesidade e excesso de peso na população de estudo de 15 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental	Total	Sobrepeso			Obesidade			Excesso de peso		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	incompleto	473	136	28,8	(24,8-32,7)	60	12,7	(9,8-15,5)	196	41,4	(37,2-45,7)
	completo e mais	834	245	29,4	(25,0-33,7)	69	8,3	(6,2-10,3)	314	37,6	(33,4-41,9)
Belém	incompleto	284	69	24,3	(19,0-29,6)	19 ⁺	6,7	(3,8-9,6)	88	31,0	(25,0-37,0)
	completo e mais	681	186	27,3	(24,1-30,5)	65	9,5	(7,2-11,9)	251	36,9	(32,8-40,9)
Palmas	incompleto	284	88	31,0	(25,5-36,5)	21 ⁺	7,4	(4,6-10,2)	109	38,4	(32,6-44,2)
	completo e mais	718	158	22,0	(18,7-25,3)	45 ⁺	6,3	(4,5-8,0)	203	28,3	(24,6-32,0)
São Luís	incompleto	284	67	23,6	(19,0-28,1)	24 ⁺	8,5	(4,8-12,1)	91	32,0	(27,0-37,1)
	completo e mais	926	211	22,8	(20,0-25,6)	59	6,4	(5,0-7,8)	270	29,2	(25,8-32,5)
Fortaleza	incompleto	618	182	29,4	(25,6-33,3)	56	9,1	(6,9-11,2)	238	38,5	(33,9-43,1)
	completo e mais	1107	323	29,2	(26,5-31,8)	110	9,9	(8,3-11,6)	433	39,1	(36,4-41,9)
Natal	incompleto	249	54	21,7	(17,6-25,8)	26 ⁺	10,4	(6,4-14,5)	80	32,1	(27,1-37,1)
	completo e mais	366	89	24,3	(19,7-29,0)	38 ⁺	10,4	(6,8-13,9)	127	34,7	(28,8-40,6)
João Pessoa	incompleto	328	76	23,2	(18,6-27,8)	33 ⁺	10,1	(6,5-13,6)	109	33,2	(28,4-38,1)
	completo e mais	592	170	28,7	(25,0-32,4)	59	10,0	(8,1-11,8)	229	38,7	(34,5-42,9)
Recife	incompleto	281	81	28,8	(23,7-33,9)	33 ⁺	11,7	(7,7-15,7)	114	40,6	(34,6-46,6)
	completo e mais	490	138	28,2	(24,6-31,7)	59	12,0	(9,4-14,7)	197	40,2	(35,8-44,6)
Aracaju	incompleto	233	62	26,6	(20,4-32,8)	19 ⁺	8,2	(3,7-12,6)	81	34,8	(27,2-42,4)
	completo e mais	424	98	23,1	(19,3-26,9)	35 ⁺	8,3	(4,9-11,6)	133	31,4	(27,0-35,7)
Belo Horizonte	incompleto	665	187	28,1	(24,6-31,6)	76	11,4	(9,2-13,7)	263	39,5	(35,5-43,6)
	completo e mais	1191	325	27,3	(24,8-29,8)	97	8,1	(6,5-9,8)	422	35,4	(32,6-38,2)
Vitória	incompleto	145	47 ⁺	32,4	(25,0-39,8)	17 ⁺	11,7	(7,0-16,5)	64	44,1	(35,4-52,9)
	completo e mais	534	151	28,3	(24,5-32,1)	37 ⁺	6,9	(4,8-9,1)	188	35,2	(31,4-39,0)
Rio de Janeiro	incompleto	588	223	37,9	(34,0-41,8)	89	15,1	(12,1-18,2)	312	53,1	(49,2-56,9)
	completo e mais	1703	543	31,9	(29,7-34,0)	205	12,0	(10,2-13,9)	748	43,9	(41,5-46,3)
São Paulo	incompleto	363	121	33,3	(28,0-38,7)	56	15,4	(12,0-18,9)	177	48,8	(43,5-54,0)
	completo e mais	684	182	26,6	(23,2-30,0)	64	9,4	(6,6-12,1)	246	36,0	(32,1-39,8)
Curitiba	incompleto	653	229	35,1	(31,0-39,1)	87	13,3	(10,7-15,9)	316	48,4	(43,9-52,9)
	completo e mais	1437	394	27,4	(25,1-29,8)	135	9,4	(7,7-11,0)	529	36,8	(33,9-39,7)
Florianópolis	incompleto	224	71	31,7	(23,6-39,8)	36 ⁺	16,1	(11,2-20,9)	107	47,8	(39,5-56,1)
	completo e mais	533	141	26,5	(23,0-29,9)	42 ⁺	7,9	(5,9-9,9)	183	34,3	(30,1-38,5)
Porto Alegre	incompleto	388	118	30,4	(26,5-34,3)	71	18,3	(14,8-21,8)	189	48,7	(44,0-53,4)
	completo e mais	934	287	30,7	(27,8-33,6)	91	9,7	(7,7-11,8)	378	40,5	(37,3-43,7)
Campo Grande	incompleto	212	58	27,4	(21,4-33,3)	29 ⁺	13,7	(8,9-18,5)	87	41,0	(34,6-47,5)
	completo e mais	383	94	24,5	(20,8-28,3)	37 ⁺	9,7	(6,8-12,5)	131	34,2	(29,4-39,0)
Distrito Federal	incompleto	546	145	26,6	(22,4-30,7)	58	10,6	(8,6-12,6)	203	37,2	(32,7-41,6)
	completo e mais	1174	293	25,0	(22,5-27,4)	90	7,7	(6,0-9,4)	383	32,6	(29,7-35,5)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados com sobrepeso ou obesidade nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

* $25 \text{ kg/m}^2 \leq \text{IMC} < 30 \text{ kg/m}^2$

** $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$

*** $\text{IMC} \geq 25 \text{ kg/m}^2$

Tabela 7.1. Percentual de indivíduos que consomem frutas, legumes ou verduras cinco vezes ou mais por semana, na população de estudo de 15 anos ou mais, por tipo de alimento, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total	Consumo								
		Frutas			Legumes ou verduras			Frutas ou legumes ou verduras		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	1704	675	39,6	(36,3-43,0)	415	24,4	(21,4-27,3)	868	50,9	(47,6-54,3)
Belém	1410	618	43,8	(39,9-47,7)	290	20,6	(17,7-23,5)	719	51,0	(47,0-55,0)
Palmas	1234	501	40,6	(35,9-45,3)	449	36,4	(31,4-41,4)	707	57,3	(52,3-62,3)
São Luís	1733	820	47,3	(42,7-51,9)	334	19,3	(15,8-22,7)	937	54,1	(49,9-58,2)
Fortaleza	2267	1237	54,6	(50,8-58,4)	600	26,5	(23,0-29,9)	1386	61,1	(57,3-65,0)
Natal	810	606	74,8	(70,8-78,8)	411	50,7	(45,5-56,0)	659	81,4	(77,8-85,0)
João Pessoa	1205	697	57,8	(51,9-63,8)	587	48,7	(43,6-53,8)	859	71,3	(65,7-76,8)
Recife	1010	599	59,3	(54,5-64,1)	414	41,0	(36,7-45,3)	710	70,3	(65,7-74,9)
Aracaju	842	543	64,5	(59,5-69,5)	360	42,8	(39,2-46,3)	621	73,8	(69,5-78,0)
Belo Horizonte	2255	1095	48,6	(45,0-52,1)	1220	54,1	(51,1-57,1)	1597	70,8	(67,8-73,9)
Vitória	767	342	44,6	(38,9-50,3)	378	49,3	(42,6-56,0)	496	64,7	(58,4-71,0)
Rio de Janeiro	2692	1352	50,2	(47,4-53,1)	1191	44,2	(41,1-47,4)	1796	66,7	(63,8-69,6)
São Paulo	1210	516	42,6	(39,1-46,2)	589	48,7	(44,9-52,4)	783	64,7	(61,3-68,2)
Curitiba	2337	1057	45,2	(42,5-48,0)	1266	54,2	(51,2-57,1)	1599	68,4	(65,8-71,0)
Florianópolis	850	454	53,4	(47,4-59,4)	444	52,2	(47,8-56,7)	607	71,4	(66,8-76,0)
Porto Alegre	1395	702	50,3	(46,0-54,7)	789	56,6	(52,9-60,2)	994	71,3	(67,9-74,6)
Campo Grande	697	248	35,6	(30,3-40,8)	301	43,2	(38,3-48,1)	396	56,8	(51,7-62,0)
Distrito Federal	1995	979	49,1	(44,7-53,4)	978	49,0	(45,7-52,4)	1340	67,2	(63,6-70,7)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 7.2. Percentual de indivíduos que consomem frutas, legumes ou verduras cinco vezes ou mais por semana, na população de estudo de 15 anos ou mais, por tipo de alimento e sexo, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Sexo	Total	Consumo de								
			Frutas			Legumes ou verduras			Frutas ou legumes ou verduras		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	Masculino	766	279	36,4	(32,0-40,8)	184	24,0	(20,2-27,9)	376	49,1	(44,6-53,6)
	Feminino	938	396	42,2	(38,6-45,8)	231	24,6	(21,4-27,8)	492	52,5	(48,9-56,0)
Belém	Masculino	599	243	40,6	(34,9-46,2)	115	19,2	(16,1-22,3)	285	47,6	(41,7-53,5)
	Feminino	811	375	46,2	(42,3-50,2)	175	21,6	(17,9-25,3)	434	53,5	(49,6-57,4)
Palmas	Masculino	601	236	39,3	(34,1-44,4)	188	31,3	(25,7-36,9)	330	54,9	(49,1-60,8)
	Feminino	633	265	41,9	(35,5-48,3)	261	41,2	(35,8-46,7)	377	59,6	(53,8-65,3)
São Luís	Masculino	754	333	44,2	(39,6-48,7)	132	17,5	(14,4-20,6)	387	51,3	(47,2-55,5)
	Feminino	979	487	49,7	(44,6-54,9)	202	20,6	(16,1-25,1)	550	56,2	(51,1-61,2)
Fortaleza	Masculino	1001	523	52,2	(48,2-56,3)	243	24,3	(20,5-28,1)	587	58,6	(54,7-62,6)
	Feminino	1266	714	56,4	(52,2-60,5)	357	28,2	(24,6-31,8)	799	63,1	(58,9-67,3)
Natal	Masculino	352	254	72,2	(66,5-77,8)	177	50,3	(44,1-56,4)	277	78,7	(73,8-83,6)
	Feminino	458	352	76,9	(72,2-81,5)	234	51,1	(44,4-57,7)	382	83,4	(78,9-87,9)
João Pessoa	Masculino	490	261	53,3	(46,1-60,4)	230	46,9	(41,1-52,8)	334	68,2	(61,6-74,8)
	Feminino	715	436	61,0	(54,9-67,1)	357	49,9	(44,5-55,4)	525	73,4	(67,6-79,2)
Recife	Masculino	434	252	58,1	(52,0-64,2)	183	42,2	(36,8-47,6)	306	70,5	(65,0-76,0)
	Feminino	576	347	60,2	(55,1-65,4)	231	40,1	(35,2-45,0)	404	70,1	(65,1-75,1)
Aracaju	Masculino	354	221	62,4	(56,1-68,8)	139	39,3	(34,8-43,7)	254	71,8	(66,4-77,1)
	Feminino	488	322	66,0	(60,6-71,4)	221	45,3	(40,4-50,1)	367	75,2	(70,6-79,8)
Belo Horizonte	Masculino	985	433	44,0	(40,3-47,6)	492	49,9	(46,7-53,2)	661	67,1	(63,7-70,5)
	Feminino	1270	662	52,1	(47,7-56,5)	728	57,3	(53,6-61,1)	936	73,7	(69,9-77,5)
Vitória	Masculino	353	135	38,2	(32,0-44,5)	156	44,2	(36,1-52,3)	207	58,6	(51,3-65,9)
	Feminino	414	207	50,0	(43,2-56,8)	222	53,6	(46,6-60,6)	289	69,8	(63,1-76,5)
Rio de Janeiro	Masculino	1096	516	47,1	(43,7-50,5)	405	37,0	(33,5-40,4)	678	61,9	(58,2-65,5)
	Feminino	1596	836	52,4	(49,0-55,7)	786	49,2	(45,6-52,9)	1118	70,1	(67,0-73,1)
São Paulo	Masculino	524	198	37,8	(33,6-42,0)	229	43,7	(39,1-48,3)	311	59,4	(54,8-63,9)
	Feminino	686	318	46,4	(42,0-50,7)	360	52,5	(47,9-57,1)	472	68,8	(64,9-72,7)
Curitiba	Masculino	1045	414	39,6	(36,1-43,1)	506	48,4	(44,7-52,1)	657	62,9	(59,5-66,3)
	Feminino	1292	643	49,8	(46,6-52,9)	760	58,8	(55,6-62,0)	942	72,9	(70,1-75,7)
Florianópolis	Masculino	379	193	50,9	(43,8-58,0)	161	42,5	(37,0-48,0)	244	64,4	(58,4-70,3)
	Feminino	471	261	55,4	(49,1-61,8)	283	60,1	(55,1-65,0)	363	77,1	(72,2-81,9)
Porto Alegre	Masculino	618	261	42,2	(37,3-47,1)	306	49,5	(45,2-53,8)	399	64,6	(60,6-68,5)
	Feminino	777	441	56,8	(51,8-61,7)	483	62,2	(57,8-66,5)	595	76,6	(72,5-80,6)
Campo Grande	Masculino	308	92	29,9	(23,9-35,8)	103	33,4	(27,1-39,7)	146	47,4	(40,8-54,0)
	Feminino	389	156	40,1	(33,7-46,5)	198	50,9	(45,7-56,1)	250	64,3	(58,5-70,1)
Distrito Federal	Masculino	865	383	44,3	(39,9-48,6)	370	42,8	(38,6-46,9)	537	62,1	(57,6-66,6)
	Feminino	1130	596	52,7	(47,6-57,9)	608	53,8	(49,8-57,8)	803	71,1	(67,0-75,1)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 7.3. Percentual de indivíduos que consomem frutas, legumes ou verduras cinco vezes ou mais por semana, na população de estudo de 15 anos ou mais, por tipo de alimento e faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária	Total	Consumo								
			Frutas			Legumes ou verduras			Frutas ou legumes ou verduras		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	15 a 24 anos	536	215	40,1	(35,7-44,6)	122	22,8	(18,0-27,5)	271	50,6	(46,1-55,0)
	25 a 49 anos	902	369	40,9	(36,8-45,0)	235	26,1	(22,9-29,2)	475	52,7	(48,8-56,5)
	50 anos e mais	266	91	34,2	(26,9-41,5)	58	21,8	(16,1-27,5)	122	45,9	(39,0-52,8)
Belém	15 a 24 anos	431	182	42,2	(36,4-48,0)	84	19,5	(15,1-23,9)	217	50,3	(44,7-56,0)
	25 a 49 anos	708	302	42,7	(38,1-47,2)	143	20,2	(17,2-23,2)	353	49,9	(45,2-54,5)
	50 anos e mais	271	134	49,4	(41,7-57,2)	63	23,2	(17,0-29,5)	149	55,0	(47,1-62,9)
Palmas	15 a 24 anos	423	162	38,3	(33,2-43,4)	131	31,0	(24,9-37,1)	231	54,6	(48,8-60,4)
	25 a 49 anos	687	287	41,8	(35,4-48,1)	278	40,5	(34,4-46,6)	412	60,0	(53,9-66,1)
	50 anos e mais	124	52	41,9	(33,0-50,9)	40 ⁺	32,3	(21,3-43,2)	64	51,6	(41,1-62,1)
São Luís	15 a 24 anos	574	242	42,2	(36,9-47,4)	88	15,3	(11,4-19,2)	278	48,4	(43,4-53,5)
	25 a 49 anos	877	420	47,9	(42,2-53,6)	172	19,6	(15,8-23,4)	482	55,0	(49,9-60,0)
	50 anos e mais	282	158	56,0	(47,5-64,5)	74	26,2	(19,0-33,5)	177	62,8	(54,5-71,0)
Fortaleza	15 a 24 anos	647	345	53,3	(49,0-57,7)	123	19,0	(15,5-22,6)	384	59,4	(55,2-63,5)
	25 a 49 anos	1116	601	53,9	(49,5-58,2)	311	27,9	(23,9-31,9)	670	60,0	(55,9-64,2)
	50 anos e mais	504	291	57,7	(51,1-64,4)	166	32,9	(27,3-38,6)	332	65,9	(59,2-72,6)
Natal	15 a 24 anos	240	171	71,3	(65,5-77,0)	100	41,7	(34,4-49,0)	185	77,1	(71,4-82,8)
	25 a 49 anos	396	304	76,8	(71,6-82,0)	220	55,6	(49,6-61,5)	328	82,8	(78,4-87,3)
	50 anos e mais	174	131	75,3	(68,6-81,9)	91	52,3	(42,5-62,1)	146	83,9	(78,1-89,7)
João Pessoa	15 a 24 anos	319	176	55,2	(46,7-63,7)	95	29,8	(24,0-35,6)	197	61,8	(53,9-69,6)
	25 a 49 anos	619	357	57,7	(51,6-63,8)	344	55,6	(50,3-60,9)	458	74,0	(68,6-79,3)
	50 anos e mais	267	164	61,4	(52,0-70,8)	148	55,4	(45,8-65,1)	204	76,4	(68,1-84,7)
Recife	15 a 24 anos	248	140	56,5	(48,6-64,3)	70	28,2	(21,9-34,6)	160	64,5	(56,3-72,7)
	25 a 49 anos	495	293	59,2	(53,8-64,6)	225	45,5	(40,1-50,8)	353	71,3	(66,4-76,2)
	50 anos e mais	267	166	62,2	(54,5-69,9)	119	44,6	(38,1-51,0)	197	73,8	(67,4-80,2)
Aracaju	15 a 24 anos	249	159	63,9	(56,0-71,7)	99	39,8	(33,0-46,5)	183	73,5	(65,6-81,4)
	25 a 49 anos	428	279	65,2	(59,6-70,8)	185	43,2	(38,9-47,5)	316	73,8	(69,2-78,5)
	50 anos e mais	165	105	63,6	(53,3-73,9)	76	46,1	(36,6-55,5)	122	73,9	(65,8-82,1)
Belo Horizonte	15 a 24 anos	563	271	48,1	(43,2-53,0)	256	45,5	(41,5-49,5)	382	67,9	(63,3-72,4)
	25 a 49 anos	1187	519	43,7	(39,8-47,6)	663	55,9	(52,4-59,3)	827	69,7	(66,1-73,2)
	50 anos e mais	505	305	60,4	(55,1-65,7)	301	59,6	(53,6-65,6)	388	76,8	(72,0-81,7)
Vitória	15 a 24 anos	199	80	40,2	(34,1-46,3)	87	43,7	(33,7-53,8)	122	61,3	(53,4-69,2)
	25 a 49 anos	378	163	43,1	(36,6-49,7)	185	48,9	(42,4-55,5)	241	63,8	(57,4-70,1)
	50 anos e mais	190	99	52,1	(42,8-61,4)	106	55,8	(46,3-65,3)	133	70,0	(60,8-79,2)
Rio de Janeiro	15 a 24 anos	537	248	46,2	(41,9-50,5)	168	31,3	(26,9-35,6)	310	57,7	(53,5-61,9)
	25 a 49 anos	1302	611	46,9	(43,7-50,2)	589	45,2	(42,0-48,5)	864	66,4	(63,1-69,6)
	50 anos e mais	853	493	57,8	(53,1-62,5)	434	50,9	(46,0-55,8)	622	72,9	(68,5-77,4)
São Paulo	15 a 24 anos	326	118	36,2	(30,9-41,5)	128	39,3	(33,5-45,0)	180	55,2	(49,7-60,7)
	25 a 49 anos	613	266	43,4	(39,5-47,3)	310	50,6	(46,2-54,9)	412	67,2	(63,2-71,2)
	50 anos e mais	271	132	48,7	(41,8-55,6)	151	55,7	(48,7-62,8)	191	70,5	(64,0-77,0)
Curitiba	15 a 24 anos	562	219	39,0	(34,7-43,2)	236	42,0	(38,0-46,0)	329	58,5	(54,3-62,8)
	25 a 49 anos	1266	531	41,9	(38,6-45,3)	729	57,6	(53,8-61,3)	874	69,0	(65,6-72,4)
	50 anos e mais	509	307	60,3	(55,0-65,6)	301	59,1	(53,5-64,8)	396	77,8	(73,2-82,4)
Florianópolis	15 a 24 anos	194	84	43,3	(33,7-52,9)	58	29,9	(22,6-37,2)	108	55,7	(45,4-65,9)
	25 a 49 anos	413	214	51,8	(45,4-58,2)	231	55,9	(50,4-61,5)	302	73,1	(67,5-78,7)
	50 anos e mais	243	156	64,2	(54,9-73,5)	155	63,8	(56,4-71,2)	197	81,1	(74,5-87,7)
Porto Alegre	15 a 24 anos	320	121	37,8	(31,2-44,5)	120	37,5	(31,1-43,9)	177	55,3	(48,3-62,3)
	25 a 49 anos	663	316	47,7	(43,7-51,6)	408	61,5	(57,4-65,6)	482	72,7	(69,4-76,0)
	50 anos e mais	412	265	64,3	(57,2-71,5)	261	63,3	(57,5-69,2)	335	81,3	(76,4-86,2)
Campo Grande	15 a 24 anos	206	75	36,4	(28,3-44,5)	78	37,9	(31,1-44,7)	115	55,8	(47,8-63,8)
	25 a 49 anos	332	122	36,7	(30,3-43,2)	161	48,5	(42,2-54,8)	199	59,9	(53,9-66,0)
	50 anos e mais	159	51	32,1	(24,4-39,7)	62	39,0	(29,7-48,2)	82	51,6	(42,6-60,5)
Distrito Federal	15 a 24 anos	598	298	49,8	(45,5-54,2)	236	39,5	(35,8-43,1)	376	62,9	(58,5-67,2)
	25 a 49 anos	1040	515	49,5	(44,5-54,5)	571	54,9	(51,1-58,7)	733	70,5	(66,7-74,3)
	50 anos e mais	357	166	46,5	(39,3-53,7)	171	47,9	(41,7-54,1)	231	64,7	(58,3-71,1)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 7.4. Percentual de indivíduos que consomem frutas, legumes ou verduras cinco vezes ou mais por semana, na população de estudo de 15 anos ou mais, por tipo de alimento e escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental	Total	Consumo								
			Frutas			Legumes ou verduras			Frutas ou legumes ou verduras		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	incompleto	732	245	33,5	(29,6-37,3)	152	20,8	(17,0-24,5)	322	44,0	(40,0-48,0)
	completo e mais	959	425	44,3	(40,3-48,3)	262	27,3	(23,6-31,0)	541	56,4	(52,6-60,2)
Belém	incompleto	566	217	38,3	(34,2-42,5)	69	12,2	(9,1-15,2)	242	42,8	(38,3-47,2)
	completo e mais	839	396	47,2	(42,3-52,1)	218	26,0	(22,4-29,5)	472	56,3	(51,4-61,1)
Palmas	incompleto	394	129	32,7	(27,4-38,1)	111	28,2	(21,7-34,6)	186	47,2	(40,9-53,5)
	completo e mais	819	363	44,3	(39,4-49,2)	331	40,4	(35,3-45,5)	510	62,3	(57,6-67,0)
São Luís	incompleto	562	223	39,7	(34,5-44,8)	95	16,9	(13,3-20,5)	269	47,9	(43,5-52,2)
	completo e mais	1163	592	50,9	(45,6-56,2)	235	20,2	(15,9-24,5)	662	56,9	(51,8-62,1)
Fortaleza	incompleto	982	471	48,0	(43,2-52,7)	187	19,0	(15,9-22,2)	524	53,4	(48,4-58,3)
	completo e mais	1258	751	59,7	(55,2-64,2)	406	32,3	(28,0-36,5)	845	67,2	(63,2-71,2)
Natal	incompleto	383	280	73,1	(67,4-78,8)	179	46,7	(39,7-53,8)	304	79,4	(73,9-84,8)
	completo e mais	400	309	77,3	(72,3-82,2)	214	53,5	(47,2-59,8)	334	83,5	(79,5-87,5)
João Pessoa	incompleto	555	275	49,5	(43,0-56,1)	271	48,8	(42,3-55,4)	379	68,3	(62,8-73,8)
	completo e mais	642	417	65,0	(57,4-72,5)	313	48,8	(42,9-54,6)	475	74,0	(66,5-81,4)
Recife	incompleto	427	217	50,8	(44,6-57,0)	154	36,1	(30,4-41,7)	277	64,9	(58,7-71,0)
	completo e mais	541	360	66,5	(61,7-71,4)	243	44,9	(39,3-50,5)	404	74,7	(70,0-79,4)
Aracaju	incompleto	360	205	56,9	(51,9-62,0)	134	37,2	(32,3-42,2)	245	68,1	(63,1-73,0)
	completo e mais	467	330	70,7	(65,1-76,2)	220	47,1	(42,6-51,6)	365	78,2	(73,6-82,7)
Belo Horizonte	incompleto	915	394	43,1	(38,3-47,8)	445	48,6	(44,5-52,7)	594	64,9	(60,5-69,4)
	completo e mais	1297	672	51,8	(47,8-55,8)	752	58,0	(54,6-61,3)	968	74,6	(71,6-77,7)
Vitória	incompleto	195	73	37,4	(28,1-46,7)	72	36,9	(28,5-45,4)	105	53,8	(44,1-63,6)
	completo e mais	556	263	47,3	(41,8-52,8)	296	53,2	(46,5-60,0)	381	68,5	(62,6-74,4)
Rio de Janeiro	incompleto	789	335	42,5	(38,3-46,6)	292	37,0	(32,9-41,2)	460	58,3	(53,6-63,0)
	completo e mais	1844	983	53,3	(50,4-56,2)	864	46,9	(43,7-50,1)	1288	69,8	(67,1-72,6)
São Paulo	incompleto	452	179	39,6	(34,2-45,0)	209	46,2	(41,2-51,3)	284	62,8	(58,0-67,7)
	completo e mais	722	325	45,0	(40,5-49,6)	366	50,7	(46,1-55,2)	481	66,6	(62,4-70,8)
Curitiba	incompleto	737	287	38,9	(34,8-43,1)	360	48,8	(44,3-53,4)	456	61,9	(57,6-66,1)
	completo e mais	1496	720	48,1	(45,1-51,2)	845	56,5	(53,2-59,8)	1071	71,6	(68,6-74,5)
Florianópolis	incompleto	263	132	50,2	(41,1-59,3)	130	49,4	(42,3-56,5)	177	67,3	(59,5-75,1)
	completo e mais	559	307	54,9	(48,3-61,5)	295	52,8	(47,6-58,0)	408	73,0	(67,5-78,4)
Porto Alegre	incompleto	425	202	47,5	(41,4-53,7)	227	53,4	(47,1-59,7)	288	67,8	(62,7-72,8)
	completo e mais	953	488	51,2	(46,7-55,8)	551	57,8	(54,0-61,6)	692	72,6	(68,9-76,3)
Campo Grande	incompleto	256	75	29,3	(22,3-36,3)	88	34,4	(27,3-41,4)	118	46,1	(37,9-54,3)
	completo e mais	409	161	39,4	(32,9-45,8)	196	47,9	(42,3-53,5)	258	63,1	(57,8-68,3)
Distrito Federal	incompleto	707	245	34,7	(29,6-39,7)	267	37,8	(34,0-41,6)	383	54,2	(49,0-59,3)
	completo e mais	1259	717	56,9	(53,1-60,8)	693	55,0	(51,3-58,8)	932	74,0	(70,9-77,2)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 7.5. Percentual de indivíduos que referiram consumir leite, carne vermelha e frango na população de estudo de 15 anos ou mais, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Consumo de											
	Leite				Carne				Frango			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1704	1479	86,8	(85,0-88,6)	1704	1661	97,5	(96,7-98,3)	1704	1682	98,7	(98,2-99,2)
Belém	1410	1192	84,5	(81,5-87,6)	1410	1391	98,7	(98,0-99,3)	1410	1374	97,4	(96,6-98,3)
Palmas	1234	957	77,6	(74,6-80,5)	1234	1211	98,1	(97,0-99,2)	1234	1212	98,2	(97,4-99,0)
São Luís	1733	1440	83,1	(80,4-85,8)	1733	1686	97,3	(96,4-98,1)	1733	1691	97,6	(96,8-98,4)
Fortaleza	2267	1773	78,2	(75,4-81,0)	2267	2197	96,9	(96,2-97,6)	2267	2211	97,5	(96,9-98,2)
Natal	810	598	73,8	(70,2-77,5)	810	739	91,2	(88,8-93,7)	810	780	96,3	(94,8-97,8)
João Pessoa	1205	893	74,1	(70,0-78,2)	1205	1135	94,2	(92,7-95,7)	1205	1172	97,3	(96,3-98,2)
Recife	1010	776	76,8	(73,9-79,8)	1010	970	96,0	(94,6-97,5)	1009	977	96,8	(95,5-98,2)
Aracaju	842	623	74,0	(70,3-77,6)	843	821	97,4	(96,2-98,5)	843	831	98,6	(97,6-99,5)
Belo Horizonte	2255	1852	82,1	(80,1-84,2)	2255	2196	97,4	(96,7-98,1)	2255	2198	97,6	(96,8-98,3)
Vitória	767	590	76,9	(73,5-80,4)	769	741	96,4	(95,0-97,7)	769	759	98,7	(97,8-99,6)
Rio de Janeiro	2692	2129	79,1	(77,2-81,0)	2692	2558	95,0	(94,0-96,0)	2692	2647	98,3	(97,8-98,9)
São Paulo	1210	940	77,7	(75,2-80,2)	1211	1149	94,9	(93,5-96,2)	1211	1178	97,3	(96,4-98,2)
Curitiba	2337	2019	86,4	(84,9-87,9)	2337	2279	97,5	(96,8-98,2)	2337	2280	97,6	(96,9-98,3)
Florianópolis	850	698	82,1	(79,5-84,7)	851	818	96,1	(94,5-97,7)	851	836	98,2	(97,2-99,2)
Porto Alegre	1395	1145	82,1	(79,5-84,6)	1396	1345	96,3	(95,1-97,6)	1396	1375	98,5	(97,8-99,2)
Campo Grande	697	494	70,9	(66,1-75,6)	697	684	98,1	(97,0-99,2)	697	675	96,8	(95,6-98,1)
Distrito Federal	1995	1685	84,5	(82,7-86,2)	1995	1918	96,1	(95,1-97,1)	1996	1975	98,9	(98,5-99,4)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 7.6. Percentual de indivíduos que referiram consumir preferencialmente leite integral, na população de estudo de 15 anos ou mais, entre aqueles que referiram beber leite, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1395	1203	86,2	(83,2-89,3)	607	537	88,5	(85,1-91,8)	788	666	84,5	(81,1-87,9)
Belém	1172	1022	87,2	(84,0-90,4)	479	433	90,4	(87,3-93,5)	693	589	85,0	(81,1-88,9)
Palmas	919	629	68,4	(61,3-75,6)	432	286	66,2	(57,9-74,5)	487	343	70,4	(63,2-77,6)
São Luís	1409	1232	87,4	(84,6-90,3)	592	523	88,3	(84,9-91,8)	817	709	86,8	(83,6-90,0)
Fortaleza	1752	1389	79,3	(75,4-83,1)	757	628	83,0	(78,8-87,1)	995	761	76,5	(72,2-80,8)
Natal	583	404	69,3	(63,1-75,5)	253	176	69,6	(62,7-76,4)	330	228	69,1	(61,5-76,7)
João Pessoa	870	723	83,1	(78,1-88,1)	321	282	87,9	(82,2-93,5)	549	441	80,3	(74,7-86,0)
Recife	758	572	75,5	(71,3-79,6)	321	255	79,4	(74,6-84,3)	437	317	72,5	(67,4-77,7)
Aracaju	559	414	74,1	(68,0-80,1)	238	184	77,3	(70,0-84,6)	321	230	71,7	(65,5-77,8)
Belo Horizonte	1802	1419	78,7	(75,8-81,7)	794	649	81,7	(78,7-84,7)	1008	770	76,4	(72,8-80,0)
Vitória	575	383	66,6	(59,7-73,5)	268	197	73,5	(67,1-79,9)	307	186	60,6	(52,2-69,0)
Rio de Janeiro	2022	1362	67,4	(62,9-71,8)	818	595	72,7	(68,6-76,9)	1204	767	63,7	(58,6-68,8)
São Paulo	922	696	75,5	(70,8-80,1)	404	320	79,2	(74,2-84,2)	518	376	72,6	(67,1-78,1)
Curitiba	1986	1545	77,8	(74,5-81,1)	859	707	82,3	(79,0-85,6)	1127	838	74,4	(70,4-78,3)
Florianópolis	676	423	62,6	(55,7-69,5)	303	208	68,6	(61,7-75,6)	373	215	57,6	(49,7-65,6)
Porto Alegre	1116	681	61,0	(55,2-66,9)	494	316	64,0	(57,7-70,2)	622	365	58,7	(52,5-64,8)
Campo Grande	489	354	72,4	(65,9-78,9)	200	155	77,5	(70,3-84,7)	289	199	68,9	(61,4-76,3)
Distrito Federal	1663	1185	71,3	(66,4-76,2)	716	522	72,9	(68,3-77,5)	947	663	70,0	(64,1-76,0)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 7.7. Percentual de indivíduos que referiram que nunca, quase nunca ou só algumas vezes retiram a gordura visível da carne, na população de estudo de 15 anos ou mais, entre aqueles que referiram consumir carne vermelha, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1661	641	38,6	(35,8-41,3)	757	371	49,0	(45,5-52,5)	904	270	29,9	(26,3-33,4)
Belém	1390	569	40,9	(37,7-44,2)	591	303	51,3	(46,9-55,7)	799	266	33,3	(29,7-36,9)
Palmas	1211	584	48,2	(45,5-50,9)	590	353	59,8	(55,9-63,8)	621	231	37,2	(33,6-40,8)
São Luís	1685	696	41,3	(38,4-44,2)	739	380	51,4	(47,2-55,6)	946	316	33,4	(30,0-36,8)
Fortaleza	2197	889	40,5	(37,2-43,7)	980	495	50,5	(46,8-54,2)	1217	394	32,4	(29,0-35,8)
Natal	739	266	36,0	(32,3-39,7)	327	156	47,7	(42,0-53,4)	412	110	26,7	(21,8-31,6)
João Pessoa	1134	395	34,8	(31,1-38,6)	471	208	44,2	(39,2-49,1)	663	187	28,2	(23,9-32,5)
Recife	966	298	30,8	(26,7-35,0)	420	168	40,0	(34,8-45,2)	546	130	23,8	(19,3-28,3)
Aracaju	819	305	37,2	(32,9-41,5)	347	160	46,1	(40,4-51,9)	472	145	30,7	(25,5-35,9)
Belo Horizonte	2194	1054	48,0	(45,3-50,8)	962	556	57,8	(54,4-61,2)	1232	498	40,4	(37,1-43,7)
Vitória	741	324	43,7	(39,2-48,3)	345	190	55,1	(49,5-60,6)	396	134	33,8	(28,6-39,1)
Rio de Janeiro	2557	834	32,6	(30,0-35,2)	1060	435	41,0	(37,6-44,5)	1497	399	26,7	(23,9-29,4)
São Paulo	1149	444	38,6	(34,8-42,5)	503	243	48,3	(42,9-53,7)	646	201	31,1	(27,0-35,2)
Curitiba	2278	895	39,3	(36,5-42,1)	1026	529	51,6	(47,6-55,6)	1252	366	29,2	(26,1-32,4)
Florianópolis	818	278	34,0	(29,0-38,9)	370	161	43,5	(37,0-50,0)	448	117	26,1	(21,1-31,2)
Porto Alegre	1344	471	35,0	(31,6-38,4)	605	267	44,1	(38,9-49,3)	739	204	27,6	(24,3-30,9)
Campo Grande	684	337	49,3	(44,3-54,2)	307	182	59,3	(53,9-64,7)	377	155	41,1	(34,9-47,4)
Distrito Federal	1918	796	41,5	(38,2-44,8)	840	467	55,6	(51,5-59,7)	1078	329	30,5	(26,8-34,3)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 7.8. Percentual de indivíduos que referiram que nunca, quase nunca ou só algumas vezes retiram a pele do frango na população de estudo de 15 anos ou mais, entre aqueles que referiram consumir frango, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1682	206	12,2	(9,9-14,6)	754	135	17,9	(14,4-21,4)	928	71	7,7	(5,6-9,7)
Belém	1374	262	19,1	(16,4-21,8)	580	172	29,7	(25,4-33,9)	794	90	11,3	(8,8-13,9)
Palmas	1210	369	30,5	(27,2-33,8)	588	233	39,6	(35,1-44,1)	622	136	21,9	(18,2-25,5)
São Luís	1690	259	15,3	(13,0-17,7)	738	170	23,0	(18,8-27,2)	952	89	9,3	(7,9-10,8)
Fortaleza	2211	566	25,6	(22,9-28,3)	976	351	36,0	(32,2-39,7)	1235	215	17,4	(14,8-20,1)
Natal	779	148	19,0	(15,3-22,7)	337	93	27,6	(22,0-33,2)	442	55	12,4	(8,7-16,2)
João Pessoa	1172	198	16,9	(14,2-19,6)	482	131	27,2	(22,8-31,5)	690	67	9,7	(7,4-12,1)
Recife	972	160	16,5	(13,8-19,1)	420	107	25,5	(20,9-30,1)	552	53	9,6	(7,1-12,1)
Aracaju	831	146	17,6	(14,9-20,2)	348	93	26,7	(22,5-30,9)	483	53	11,0	(8,2-13,7)
Belo Horizonte	2200	798	36,3	(33,6-39,0)	955	442	46,3	(43,0-49,5)	1245	356	28,6	(25,4-31,8)
Vitória	759	229	30,2	(25,5-34,8)	348	134	38,5	(32,7-44,3)	411	95	23,1	(18,5-27,7)
Rio de Janeiro	2646	634	24,0	(21,7-26,2)	1077	361	33,5	(30,4-36,6)	1569	273	17,4	(15,1-19,7)
São Paulo	1178	365	31,0	(27,9-34,1)	511	198	38,7	(33,7-43,8)	667	167	25,0	(21,6-28,5)
Curitiba	2280	830	36,4	(33,8-39,0)	1017	494	48,6	(45,0-52,1)	1263	336	26,6	(23,8-29,4)
Florianópolis	836	226	27,0	(22,3-31,7)	371	136	36,7	(30,3-43,0)	465	90	19,4	(14,3-24,4)
Porto Alegre	1375	474	34,5	(31,0-38,0)	606	282	46,5	(41,8-51,3)	769	192	25,0	(21,4-28,6)
Campo Grande	674	310	46,0	(40,5-51,5)	294	153	52,0	(45,9-58,2)	380	157	41,3	(34,4-48,2)
Distrito Federal	1975	459	23,2	(20,8-25,6)	857	299	34,9	(31,3-38,4)	1118	160	14,3	(12,1-16,5)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 7.9. Percentual de indivíduos^a que costumam ler as informações sobre prazo de validade e valor nutricional contidas nos rótulos de alimentos embalados, na população de estudo de 15 anos ou mais, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total	Informação sobre					
		prazo de validade			valor nutricional		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	1062	880	83,2	(80,3-86,1)	515	48,8	(43,9-53,8)
Belém	872	663	76,9	(73,7-80,1)	364	42,1	(37,5-46,8)
Palmas	1190	884	74,3	(70,8-77,8)	505	42,4	(37,2-47,6)
São Luís	1658	1290	77,8	(75,1-80,5)	725	43,7	(40,2-47,3)
Fortaleza	1379	1073	77,3	(74,5-80,1)	602	43,1	(39,3-47,0)
Natal	761	570	74,9	(71,7-78,1)	343	45,1	(40,4-49,8)
João Pessoa	705	522	75,0	(70,0-80,0)	260	37,3	(31,6-42,9)
Recife	946	685	72,4	(69,1-75,8)	390	41,2	(37,4-45,1)
Aracaju	809	646	79,9	(77,4-82,3)	356	44,0	(39,0-49,0)
Belo Horizonte	1359	1063	78,3	(75,6-81,0)	607	42,9	(39,9-45,9)
Vitória	742	609	82,1	(77,9-86,2)	369	49,7	(46,3-53,2)
Rio de Janeiro	1580	1254	80,0	(77,4-82,6)	630	38,7	(35,6-41,7)
São Paulo	1159	918	79,2	(76,2-82,2)	602	51,9	(48,1-55,8)
Curitiba	1391	1065	77,7	(74,8-80,5)	576	41,5	(37,9-45,0)
Florianópolis	831	696	83,8	(80,2-87,3)	453	54,5	(49,3-59,7)
Porto Alegre	814	653	80,0	(76,8-83,1)	377	46,1	(42,1-50,1)
Campo Grande	667	508	76,2	(72,2-80,1)	328	49,2	(44,2-54,1)
Distrito Federal	1243	986	79,9	(76,3-83,5)	580	46,5	(42,6-50,3)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

^a *Nota: Nesta Tabela foram excluídos todos os entrevistados não alfabetizados ou que não declararam o seu grau de escolaridade.*

Tabela 7.10. Percentual de indivíduos^a que costumam ler as informações sobre prazo de validade e valor nutricional contidas nos rótulos de alimentos embalados, na população de estudo de 15 anos ou mais, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Sexo	Total	Informação sobre					
			prazo de validade			valor nutricional		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	Masculino	466	366	79,1	(74,8-83,3)	192	40,9	(35,3-46,5)
	Feminino	596	514	86,5	(83,0-89,9)	323	55,0	(48,8-61,3)
Belém	Masculino	374	243	66,2	(60,5-71,9)	115	29,7	(22,7-36,7)
	Feminino	498	420	84,8	(81,0-88,6)	249	51,3	(46,2-56,4)
Palmas	Masculino	575	382	66,4	(60,8-72,1)	208	36,2	(29,4-43,0)
	Feminino	615	502	81,6	(78,2-85,1)	297	48,3	(42,2-54,4)
São Luís	Masculino	720	508	70,6	(66,5-74,6)	268	37,2	(32,8-41,6)
	Feminino	938	782	83,4	(80,3-86,4)	457	48,7	(44,8-52,7)
Fortaleza	Masculino	620	437	70,2	(65,8-74,6)	236	38,3	(33,4-43,1)
	Feminino	759	636	82,9	(79,9-85,9)	366	47,0	(42,3-51,7)
Natal	Masculino	330	208	63,0	(57,4-68,6)	125	37,9	(31,9-43,9)
	Feminino	431	362	84,0	(80,7-87,3)	218	50,6	(45,3-55,8)
João Pessoa	Masculino	296	191	65,8	(58,2-73,4)	74	25,2	(18,5-31,9)
	Feminino	409	331	81,5	(76,4-86,6)	186	45,9	(39,5-52,3)
Recife	Masculino	411	263	64,0	(59,1-68,9)	141	34,3	(29,8-38,9)
	Feminino	535	422	78,9	(75,7-82,1)	249	46,5	(41,6-51,5)
Aracaju	Masculino	344	245	71,2	(66,3-76,2)	129	37,5	(30,4-44,6)
	Feminino	465	401	86,2	(83,8-88,7)	227	48,8	(43,6-54,1)
Belo Horizonte	Masculino	614	435	70,4	(66,1-74,8)	226	34,0	(29,9-38,1)
	Feminino	745	628	84,7	(82,2-87,3)	381	50,2	(46,3-54,1)
Vitória	Masculino	346	267	77,2	(71,2-83,1)	160	46,2	(42,0-50,5)
	Feminino	396	342	86,4	(81,4-91,3)	209	52,8	(47,1-58,5)
Rio de Janeiro	Masculino	656	463	71,7	(67,2-76,2)	211	31,0	(26,8-35,2)
	Feminino	924	791	85,7	(83,1-88,3)	419	44,0	(40,1-48,0)
São Paulo	Masculino	502	355	70,7	(65,8-75,6)	215	42,8	(38,0-47,7)
	Feminino	657	563	85,7	(82,7-88,7)	387	58,9	(54,3-63,6)
Curitiba	Masculino	633	424	68,5	(64,2-72,7)	201	31,0	(26,9-35,1)
	Feminino	758	641	85,3	(82,4-88,1)	375	50,2	(45,8-54,5)
Florianópolis	Masculino	371	284	76,5	(71,1-82,0)	165	44,5	(38,0-50,9)
	Feminino	460	412	89,6	(86,5-92,6)	288	62,6	(57,1-68,1)
Porto Alegre	Masculino	373	271	71,8	(66,9-76,8)	140	37,6	(32,5-42,7)
	Feminino	441	382	86,7	(83,2-90,3)	237	53,1	(48,2-58,1)
Campo Grande	Masculino	298	200	67,1	(61,3-73,0)	118	39,6	(33,0-46,2)
	Feminino	369	308	83,5	(79,5-87,4)	210	56,9	(51,7-62,1)
Distrito Federal	Masculino	537	387	73,2	(68,4-78,1)	222	41,1	(36,0-46,3)
	Feminino	706	599	85,0	(81,4-88,7)	358	50,6	(45,9-55,3)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

^a Nota: Nesta tabela foram excluídos todos os entrevistados não alfabetizados ou que não declararam o seu grau de escolaridade.

Tabela 7.11. Percentual de indivíduos^a que costumam ler as informações sobre prazo de validade e valor nutricional contidas nos rótulos de alimentos embalados, na população de estudo de 15 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária	Total	Informação sobre					
			prazo de validade			valor nutricional		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	15 a 24 anos	533	436	81,8	(78,5-85,1)	253	47,5	(42,4-52,5)
	25 a 49 anos	442	375	84,8	(80,9-88,8)	223	50,5	(44,4-56,5)
	50 anos e mais	87	69	79,3	(68,8-89,9)	39 ⁺	44,8	(33,4-56,3)
Belém	15 a 24 anos	429	315	73,4	(69,3-77,6)	174	40,6	(35,5-45,6)
	25 a 49 anos	338	274	81,1	(76,7-85,5)	150	44,4	(38,0-50,8)
	50 anos e mais	105	74	70,5	(61,9-79,1)	40 ⁺	38,1	(28,9-47,3)
Palmas	15 a 24 anos	423	310	73,3	(67,9-78,7)	183	43,3	(36,6-50,0)
	25 a 49 anos	664	511	77,0	(73,0-80,9)	287	43,2	(37,7-48,7)
	50 anos e mais	103	63	61,2	(53,4-69,0)	35 ⁺	34,0	(22,7-45,2)
São Luís	15 a 24 anos	574	452	78,7	(73,8-83,7)	259	45,1	(40,0-50,3)
	25 a 49 anos	853	682	80,0	(77,0-82,9)	385	45,1	(41,1-49,2)
	50 anos e mais	231	156	67,5	(61,1-74,0)	81	35,1	(28,2-41,9)
Fortaleza	15 a 24 anos	644	512	79,5	(75,8-83,2)	292	45,3	(40,5-50,2)
	25 a 49 anos	540	420	77,8	(74,0-81,6)	235	43,5	(38,2-48,8)
	50 anos e mais	195	141	72,3	(64,6-80,0)	75	38,5	(31,9-45,0)
Natal	15 a 24 anos	238	173	72,7	(67,0-78,4)	108	45,4	(39,3-51,4)
	25 a 49 anos	385	305	79,2	(74,9-83,6)	176	45,7	(40,2-51,2)
	50 anos e mais	138	92	66,7	(57,4-75,9)	59	42,8	(31,6-53,9)
João Pessoa	15 a 24 anos	315	223	70,8	(64,1-77,5)	112	35,6	(28,0-43,1)
	25 a 49 anos	275	217	78,9	(73,0-84,8)	104	37,8	(31,5-44,1)
	50 anos e mais	115	82	71,3	(61,9-80,7)	44 ⁺	38,3	(26,7-49,8)
Recife	15 a 24 anos	246	185	75,2	(69,8-80,6)	105	42,7	(36,2-49,1)
	25 a 49 anos	479	354	73,9	(69,4-78,4)	202	42,2	(36,9-47,4)
	50 anos e mais	221	146	66,1	(59,3-72,8)	83	37,6	(29,7-45,4)
Aracaju	15 a 24 anos	248	205	82,7	(77,7-87,6)	119	48,0	(40,0-56,0)
	25 a 49 anos	415	346	83,4	(79,0-87,7)	187	45,1	(39,0-51,1)
	50 anos e mais	146	95	65,1	(57,5-72,6)	50	34,2	(27,2-41,3)
Belo Horizonte	15 a 24 anos	562	438	77,9	(73,9-82,0)	289	51,4	(46,6-56,3)
	25 a 49 anos	566	464	82,0	(78,2-85,8)	236	41,7	(36,9-46,5)
	50 anos e mais	231	161	69,7	(63,8-75,6)	82	35,5	(29,8-41,2)
Vitória	15 a 24 anos	198	161	81,3	(75,5-87,1)	112	56,6	(50,1-63,0)
	25 a 49 anos	370	307	83,0	(77,5-88,5)	183	49,5	(44,6-54,4)
	50 anos e mais	174	141	81,0	(74,7-87,4)	74	42,5	(35,4-49,7)
Rio de Janeiro	15 a 24 anos	535	409	76,4	(72,2-80,7)	245	45,8	(40,2-51,4)
	25 a 49 anos	636	526	82,7	(79,5-85,9)	245	38,5	(34,6-42,4)
	50 anos e mais	409	319	78,0	(73,6-82,4)	140	34,2	(29,5-38,9)
São Paulo	15 a 24 anos	326	251	77,0	(71,2-82,7)	177	54,3	(48,3-60,3)
	25 a 49 anos	599	500	83,5	(80,3-86,7)	310	51,8	(47,1-56,4)
	50 anos e mais	234	167	71,4	(66,1-76,6)	115	49,1	(42,8-55,5)
Curitiba	15 a 24 anos	562	406	72,2	(67,6-76,9)	231	41,1	(36,3-45,9)
	25 a 49 anos	599	486	81,1	(77,4-84,8)	265	44,2	(39,6-48,9)
	50 anos e mais	230	173	75,2	(69,6-80,8)	80	34,8	(28,8-40,7)
Florianópolis	15 a 24 anos	194	169	87,1	(82,1-92,1)	114	58,8	(51,6-65,9)
	25 a 49 anos	410	358	87,3	(83,8-90,8)	241	58,8	(53,3-64,3)
	50 anos e mais	227	169	74,4	(67,0-81,9)	98	43,2	(34,5-51,8)
Porto Alegre	15 a 24 anos	320	260	81,3	(76,8-85,7)	151	47,2	(40,7-53,7)
	25 a 49 anos	317	255	80,4	(75,8-85,0)	140	44,2	(37,6-50,7)
	50 anos e mais	177	138	78,0	(72,6-83,4)	86	48,6	(41,7-55,5)
Campo Grande	15 a 24 anos	205	161	78,5	(72,5-84,6)	105	51,2	(42,9-59,5)
	25 a 49 anos	326	257	78,8	(73,5-84,2)	159	48,8	(43,0-54,6)
	50 anos e mais	136	90	66,2	(57,5-74,8)	64	47,1	(37,2-56,9)
Distrito Federal	15 a 24 anos	594	461	77,6	(74,0-81,2)	281	47,3	(43,2-51,4)
	25 a 49 anos	494	410	83,0	(79,2-86,8)	234	47,4	(42,3-52,4)
	50 anos e mais	155	115	74,2	(64,9-83,5)	65	41,9	(32,1-51,8)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

^a Nota: Nesta Tabela foram excluídos todos os entrevistados não alfabetizados ou que não declararam o seu grau de escolaridade.

Tabela 7.12. Percentual de indivíduos^a que costumam ler as informações sobre prazo de validade e valor nutricional contidas nos rótulos de alimentos embalados, na população de estudo de 15 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental	Total	Informação sobre					
			prazo de validade			valor nutricional		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	incompleto	406	313	76,4	(71,8-81,0)	176	41,8	(36,1-47,4)
	completo e mais	650	564	88,0	(85,5-90,4)	337	53,5	(47,7-59,4)
Belém	incompleto	336	232	69,8	(64,4-75,3)	117	34,8	(27,7-42,0)
	completo e mais	533	428	81,3	(77,5-85,0)	245	46,6	(41,2-52,1)
Palmas	incompleto	350	228	65,1	(61,1-69,2)	130	37,1	(28,3-46,0)
	completo e mais	819	641	78,3	(74,3-82,2)	365	44,6	(38,9-50,2)
São Luís	incompleto	488	317	65,0	(60,9-69,0)	153	31,4	(26,7-36,0)
	completo e mais	1163	969	83,3	(80,7-85,9)	567	48,8	(44,8-52,7)
Fortaleza	incompleto	526	356	67,1	(62,5-71,8)	195	36,3	(30,5-42,1)
	completo e mais	836	705	84,2	(81,8-86,6)	397	47,3	(43,1-51,5)
Natal	incompleto	334	211	63,2	(57,8-68,6)	132	39,5	(32,6-46,4)
	completo e mais	400	337	84,3	(80,5-88,0)	196	49,0	(42,8-55,2)
João Pessoa	incompleto	286	172	60,1	(53,8-66,4)	74	26,3	(19,4-33,2)
	completo e mais	416	347	84,9	(78,8-90,9)	184	44,4	(38,1-50,8)
Recife	incompleto	369	216	58,5	(53,3-63,8)	109	29,5	(24,4-34,6)
	completo e mais	541	439	81,1	(77,9-84,4)	264	48,8	(44,3-53,3)
Aracaju	incompleto	329	234	71,1	(66,4-75,8)	121	36,8	(28,7-44,8)
	completo e mais	467	400	85,7	(82,7-88,6)	231	49,5	(44,0-54,9)
Belo Horizonte	incompleto	491	334	67,1	(62,6-71,5)	168	31,8	(27,2-36,3)
	completo e mais	843	705	85,2	(82,4-88,1)	425	49,9	(46,2-53,6)
Vitória	incompleto	171	111	64,9	(57,5-72,3)	57	33,3	(25,9-40,8)
	completo e mais	556	486	87,4	(83,8-91,0)	304	54,7	(51,0-58,4)
Rio de Janeiro	incompleto	420	279	67,9	(63,0-72,8)	119	28,3	(24,0-32,5)
	completo e mais	1128	950	84,9	(82,4-87,3)	496	42,6	(39,5-45,7)
São Paulo	incompleto	408	290	71,1	(66,9-75,3)	182	44,6	(39,1-50,1)
	completo e mais	722	606	83,9	(80,6-87,3)	406	56,2	(51,8-60,6)
Curitiba	incompleto	369	244	66,9	(62,0-71,9)	103	28,0	(22,2-33,8)
	completo e mais	967	774	81,7	(79,0-84,5)	450	47,1	(43,7-50,6)
Florianópolis	incompleto	244	174	71,3	(64,2-78,5)	101	41,4	(33,9-48,9)
	completo e mais	559	498	89,1	(85,9-92,2)	339	60,6	(55,1-66,2)
Porto Alegre	incompleto	225	158	69,7	(62,6-76,8)	77	35,2	(28,2-42,3)
	completo e mais	582	489	84,2	(80,9-87,5)	296	50,5	(45,8-55,3)
Campo Grande	incompleto	227	147	64,8	(57,9-71,7)	102	44,9	(37,5-52,4)
	completo e mais	409	336	82,2	(78,4-85,9)	207	50,6	(44,5-56,8)
Distrito Federal	incompleto	394	278	70,0	(65,3-74,7)	171	42,3	(35,9-48,7)
	completo e mais	836	695	84,3	(80,4-88,2)	400	48,1	(43,9-52,3)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 8.1. Percentual de indivíduos insuficientemente ativos, na população de estudo de 15 a 69 anos, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1091	412	38,4	(33,8-43,0)	477	145	31,3	(26,2-36,3)	614	267	43,9	(37,9-50,0)
Belém	858	242	27,4	(23,6-31,2)	365	114	31,5	(26,1-36,9)	493	128	24,5	(19,5-29,4)
Palmas	1189	455	38,3	(33,1-43,4)	579	194	33,5	(27,3-39,7)	610	261	42,8	(37,1-48,5)
São Luís	1604	518	32,3	(27,5-37,1)	698	212	30,4	(24,8-36,0)	906	306	33,8	(28,7-38,8)
Fortaleza	1380	580	43,0	(38,9-47,0)	621	225	38,5	(34,0-43,0)	759	355	46,5	(41,3-51,8)
Natal	742	232	31,3	(26,4-36,1)	324	92	28,4	(22,8-34,0)	418	140	33,5	(27,5-39,5)
João Pessoa	737	402	55,1	(47,2-63,0)	308	152	51,7	(42,7-60,6)	429	250	57,5	(48,7-66,4)
Recife	931	380	40,8	(36,4-45,2)	404	147	36,4	(31,4-41,4)	527	233	44,2	(38,1-50,3)
Aracaju	804	270	33,6	(28,0-39,1)	343	93	27,1	(21,1-33,1)	461	177	38,4	(31,3-45,5)
Belo Horizonte	1325	521	40,7	(37,1-44,2)	603	210	37,5	(33,1-41,9)	722	311	43,3	(38,8-47,8)
Vitória	723	233	32,2	(28,4-36,1)	335	90	26,9	(21,6-32,1)	388	143	36,9	(31,8-41,9)
Rio de Janeiro	1499	655	44,6	(40,8-48,4)	625	217	36,9	(32,7-41,1)	874	438	50,0	(45,0-55,0)
São Paulo	1151	407	35,4	(31,9-38,9)	500	143	28,6	(24,4-32,8)	651	264	40,6	(36,3-44,8)
Curitiba	1366	548	41,5	(38,1-44,9)	619	205	35,7	(31,3-40,2)	747	343	46,3	(41,7-50,9)
Florianópolis	775	344	44,4	(38,2-50,5)	351	124	35,3	(28,5-42,2)	424	220	51,9	(45,0-58,7)
Porto Alegre	777	236	31,0	(26,6-35,3)	356	83	23,6	(19,1-28,1)	421	153	37,1	(31,0-43,3)
Campo Grande	663	226	34,1	(28,7-39,5)	291	78	26,8	(21,4-32,2)	372	148	39,8	(32,9-46,6)
Distrito Federal	1256	443	36,0	(32,1-39,8)	540	155	30,3	(25,7-35,0)	716	288	40,3	(36,0-44,5)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 8.2. Percentual de indivíduos insuficientemente ativos, na população de estudo de 15 a 69 anos, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	15 a 24 anos				25 a 49 anos				50 a 69 anos			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	531	190	35,8	(29,9-41,7)	458	175	38,2	(32,9-43,5)	102	47 ⁺	46,1	(33,9-58,3)
Belém	425	130	30,6	(25,1-36,1)	343	90	26,2	(20,8-31,7)	90	22 ⁺	24,4	(15,0-33,9)
Palmas	413	159	38,5	(31,1-45,9)	674	256	38,0	(32,6-43,4)	102	40 ⁺	39,2	(28,5-49,9)
São Luís	551	171	31,0	(24,6-37,5)	823	263	32,0	(27,2-36,7)	230	84	36,5	(28,3-44,8)
Fortaleza	643	250	38,9	(33,9-43,8)	557	240	43,1	(38,0-48,1)	180	90	50,0	(42,0-58,0)
Natal	232	60	25,9	(19,9-31,8)	380	127	33,4	(26,9-39,9)	130	45 ⁺	34,6	(26,3-42,9)
João Pessoa	316	166	52,5	(43,8-61,3)	303	170	56,1	(46,9-65,3)	118	66	55,9	(42,3-69,6)
Recife	245	81	33,1	(25,3-40,8)	491	195	39,7	(34,7-44,7)	195	104	53,3	(47,1-59,6)
Aracaju	246	79	32,1	(24,7-39,5)	424	150	35,4	(28,8-41,9)	134	41 ⁺	30,6	(22,8-38,4)
Belo Horizonte	558	191	34,2	(29,2-39,2)	565	240	42,5	(38,0-46,9)	202	147	44,6	(37,2-51,9)
Vitória	199	57	28,6	(23,1-34,2)	374	128	34,2	(28,2-40,2)	150	82	32,0	(24,5-39,5)
Rio de Janeiro	534	211	39,5	(34,6-44,4)	638	297	46,6	(41,6-51,5)	327	88	45,0	(39,4-50,5)
São Paulo	321	103	32,1	(26,6-37,6)	610	222	36,4	(31,6-41,1)	220	90	37,3	(29,9-44,7)
Curitiba	555	192	34,6	(30,0-39,1)	605	268	44,3	(40,0-48,6)	206	53	42,7	(35,0-50,5)
Florianópolis	191	70	36,6	(28,6-44,7)	399	184	46,1	(39,3-52,9)	185	46 ⁺	48,6	(38,8-58,5)
Porto Alegre	318	89	28,0	(22,3-33,7)	314	94	29,9	(24,2-35,7)	145	58	36,6	(27,8-45,3)
Campo Grande	202	59	29,2	(22,4-36,0)	325	121	37,2	(30,1-44,4)	136	90	33,8	(24,8-42,8)
Distrito Federal	593	196	33,1	(28,5-37,6)	500	189	37,8	(32,3-43,3)	163	48 ⁺	35,6	(28,3-42,9)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados classificados como insuficientemente ativos nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 8.3. Percentual de indivíduos insuficientemente ativos, na população de estudo de 15 a 69 anos, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	441	166	39,1	(32,9-45,2)	641	241	37,7	(32,6-42,7)
Belém	331	78	22,2	(16,8-27,7)	524	162	30,4	(25,7-35,1)
Palmas	371	136	36,7	(28,9-44,4)	798	306	38,3	(32,6-44,1)
São Luís	472	131	27,8	(21,8-33,7)	1125	381	33,9	(28,3-39,4)
Fortaleza	553	242	44,4	(38,5-50,2)	811	330	41,8	(37,2-46,4)
Natal	340	95	27,9	(21,9-34,0)	377	131	34,7	(28,6-40,9)
João Pessoa	329	173	52,3	(42,0-62,5)	405	228	57,6	(49,3-65,9)
Recife	374	146	39,0	(32,6-45,5)	518	219	42,3	(37,2-47,4)
Aracaju	330	93	28,2	(21,1-35,3)	460	172	37,4	(31,8-43,0)
Belo Horizonte	476	188	40,6	(35,4-45,8)	823	321	40,6	(36,2-45,0)
Vitória	171	52	30,4	(24,2-36,6)	537	176	32,8	(28,5-37,0)
Rio de Janeiro	393	201	52,0	(45,9-58,1)	1078	444	42,0	(38,0-46,0)
São Paulo	409	145	35,5	(29,7-41,2)	707	245	34,7	(30,4-38,9)
Curitiba	360	138	39,4	(33,2-45,6)	953	390	42,5	(38,7-46,4)
Florianópolis	216	91	42,1	(32,3-52,0)	534	241	45,1	(38,8-51,4)
Porto Alegre	203	80	40,0	(31,0-49,0)	568	154	27,5	(23,4-31,5)
Campo Grande	235	63	26,8	(20,1-33,5)	397	156	39,3	(33,3-45,3)
Distrito Federal	421	117	28,3	(23,6-33,0)	821	319	39,8	(35,1-44,5)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 9.1. Percentual de indivíduos que relataram ter consumido pelo menos uma dose de álcool nos últimos 30 dias (consumo atual), na população de estudo de 15 anos ou mais, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo								Razão M/F
					Masculino				Feminino				
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	
Manaus	1648	563	34,2	(31,4-36,9)	734	383	52,2	(48,5-55,9)	914	180	19,7	(16,5-22,9)	2,6
Belém	1352	525	38,8	(35,1-42,5)	565	302	53,5	(48,6-58,3)	787	223	28,3	(24,5-32,2)	1,9
Palmas	1185	541	45,7	(41,3-50,0)	578	338	58,5	(53,3-63,7)	607	203	33,4	(28,2-38,7)	1,7
São Luís	1645	679	41,3	(37,7-44,9)	699	381	54,5	(50,0-59,0)	946	298	31,5	(27,5-35,5)	1,7
Fortaleza	2245	1014	45,2	(42,1-48,2)	985	604	61,3	(57,4-65,2)	1260	410	32,5	(28,9-36,1)	1,9
Natal	789	308	39,0	(34,7-43,4)	340	194	57,1	(51,6-62,5)	449	114	25,4	(20,5-30,2)	2,2
João Pessoa	1170	379	32,4	(27,6-37,2)	462	226	48,9	(42,7-55,1)	708	153	21,6	(16,7-26,5)	2,3
Recife	990	454	45,9	(41,6-50,1)	423	250	59,1	(53,4-64,8)	567	204	36,0	(31,6-40,3)	1,6
Aracaju	836	418	50,0	(46,6-53,4)	350	231	66,0	(61,3-70,7)	486	187	38,5	(33,9-43,0)	1,7
Belo Horizonte	2239	913	51,9	(49,1-54,7)	976	636	65,2	(62,0-68,4)	1263	526	41,6	(38,1-45,2)	1,6
Vitória	761	406	53,4	(48,9-57,8)	352	239	67,9	(61,8-74,0)	409	167	40,8	(35,8-45,9)	1,7
Rio de Janeiro	2634	1229	46,7	(44,3-49,0)	1074	653	60,8	(57,6-64,0)	1560	576	36,9	(34,0-39,9)	1,6
São Paulo	1192	535	44,9	(41,5-48,3)	519	301	58,0	(53,8-62,2)	673	234	34,8	(30,3-39,2)	1,7
Curitiba	2311	1132	49,0	(46,3-51,7)	1031	661	64,1	(60,8-67,5)	1280	471	36,8	(33,5-40,1)	1,7
Florianópolis	841	493	58,6	(54,4-62,8)	376	271	72,1	(66,9-77,3)	465	222	47,7	(41,6-53,9)	1,5
Porto Alegre	1384	783	56,6	(53,5-59,6)	613	417	68,0	(63,9-72,1)	771	366	47,5	(43,4-51,5)	1,4
Campo Grande	675	1162	49,9	(45,3-54,6)	298	183	61,4	(55,0-67,8)	377	154	40,8	(35,7-46,0)	1,5
Distrito Federal	1967	337	46,4	(43,4-49,4)	853	517	60,6	(56,7-64,6)	1114	396	35,5	(32,1-39,2)	1,7

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 9.2. Percentual de indivíduos que relataram ter consumido pelo menos uma dose de álcool nos últimos 30 dias (consumo atual), na população de estudo de 15 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	15 a 24 anos				25 a 49 anos				50 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	513	151	29,4	(25,8-33,0)	873	368	42,2	(37,8-46,5)	262	44 ⁺	16,8	(10,9-22,7)
Belém	413	128	31,0	(25,1-36,9)	671	330	49,2	(44,7-53,7)	268	67	25,0	(20,1-29,9)
Palmas	401	179	44,6	(39,5-49,8)	662	326	49,2	(44,6-53,9)	122	36 ⁺	29,5	(20,7-38,3)
São Luís	540	195	36,1	(31,5-40,8)	832	412	49,5	(44,6-54,4)	273	72	26,4	(20,9-31,8)
Fortaleza	642	279	43,5	(38,9-48,0)	1101	583	53,0	(49,4-56,5)	502	152	30,3	(24,8-35,8)
Natal	232	87	37,5	(31,6-43,4)	385	173	44,9	(39,6-50,2)	172	48 ⁺	27,9	(20,2-35,6)
João Pessoa	307	93	30,3	(25,1-35,5)	600	235	39,2	(33,6-44,8)	263	51	19,4	(13,2-25,6)
Recife	241	115	47,7	(41,0-54,4)	484	265	54,8	(49,4-60,1)	265	74	27,9	(21,3-34,6)
Aracaju	247	118	47,8	(41,3-54,2)	424	239	56,4	(51,2-61,5)	165	61	37,0	(29,2-44,7)
Belo Horizonte	556	270	48,6	(44,6-52,6)	1180	692	58,6	(55,2-62,1)	503	200	39,8	(34,5-45,0)
Vitória	197	106	53,8	(46,1-61,5)	374	211	56,4	(51,1-61,7)	190	89	46,8	(38,4-55,3)
Rio de Janeiro	526	197	37,5	(33,2-41,7)	1267	712	56,2	(53,1-59,3)	841	320	38,0	(34,6-41,5)
São Paulo	322	152	47,2	(40,9-53,5)	603	291	48,3	(44,2-52,3)	267	92	34,5	(27,5-41,4)
Curitiba	560	293	52,3	(48,0-56,6)	1249	663	53,1	(50,0-56,2)	502	176	35,1	(30,1-40,0)
Florianópolis	193	118	61,1	(53,2-69,0)	408	274	67,2	(63,0-71,3)	240	101	42,1	(34,8-49,4)
Porto Alegre	315	171	54,3	(48,9-59,7)	657	422	64,2	(60,4-68,0)	412	190	46,1	(40,8-51,4)
Campo Grande	198	108	54,5	(47,5-61,6)	324	180	55,6	(49,3-61,8)	153	49 ⁺	32,0	(23,9-40,2)
Distrito Federal	587	263	44,8	(40,9-48,7)	1023	547	53,5	(49,9-57,0)	357	103	28,9	(23,5-34,2)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter consumido pelo menos uma dose de álcool nos últimos 30 dias (consumo atual) nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 9.3. Percentual de indivíduos que relataram ter consumido pelo menos uma dose de álcool nos últimos 30 dias (consumo atual), na população de estudo de 15 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	704	218	31,0	(27,7-34,2)	931	342	36,7	(32,7-40,8)
Belém	544	199	36,6	(31,7-41,5)	803	325	40,5	(36,0-44,9)
Palmas	382	133	34,8	(29,3-40,3)	782	398	50,9	(45,9-55,9)
São Luís	520	176	33,8	(29,0-38,7)	1117	496	44,4	(40,6-48,3)
Fortaleza	972	372	38,3	(35,1-41,5)	1246	632	50,7	(46,7-54,8)
Natal	374	125	33,4	(28,2-38,7)	389	170	43,7	(37,9-49,5)
João Pessoa	531	142	26,7	(22,7-30,8)	631	233	36,9	(30,7-43,1)
Recife	419	164	39,1	(33,0-44,7)	530	273	51,5	(46,2-56,8)
Aracaju	357	159	44,5	(39,3-49,7)	464	253	54,5	(50,0-59,0)
Belo Horizonte	909	390	42,9	(39,3-46,5)	1288	752	58,4	(55,0-61,7)
Vitória	195	77	39,5	(31,9-47,1)	550	322	58,5	(53,9-63,2)
Rio de Janeiro	762	261	34,3	(31,5-37,0)	1814	941	51,9	(49,0-54,7)
São Paulo	445	154	34,6	(30,1-39,1)	712	367	51,5	(47,3-55,8)
Curitiba	724	265	36,6	(32,8-40,4)	1485	815	54,9	(52,0-57,8)
Florianópolis	261	103	39,5	(34,5-44,4)	554	376	67,9	(63,6-72,1)
Porto Alegre	420	178	42,4	(37,7-47,1)	947	595	62,8	(59,4-66,3)
Campo Grande	247	87	35,2	(30,2-40,3)	398	236	59,3	(53,3-65,2)
Distrito Federal	696	255	36,6	(32,9-40,4)	1243	647	52,1	(48,9-55,2)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 9.4. Prevalência de consumo diário de álcool considerado de risco* nos últimos 30 dias, na população de estudo de 15 anos ou mais, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total	Consumo de risco		
		n	%	IC _{95%}
Manaus	1646	124	7,5	(6,2-8,9)
Belém	1352	94	7,0	(5,7-8,2)
Palmas	1181	78	6,6	(4,9-8,3)
São Luís	1642	208	12,7	(9,8-15,5)
Fortaleza	2242	248	11,1	(9,3-12,8)
Natal	785	76	9,7	(7,5-11,9)
João Pessoa	1169	90	7,7	(5,7-9,7)
Recife	987	120	12,2	(9,7-14,6)
Aracaju	834	65	7,8	(6,1-9,4)
Belo Horizonte	2237	243	10,9	(9,6-12,1)
Vitória	760	94	12,4	(9,5-15,3)
Rio de Janeiro	2629	244	9,3	(8,2-10,4)
São Paulo	1188	58	4,9	(3,6-6,1)
Curitiba	2308	107	4,6	(3,8-5,5)
Florianópolis	834	39+	4,7	(3,1-6,2)
Porto Alegre	1384	101	7,3	(5,9-8,7)
Campo Grande	674	45+	6,7	(4,3-9,0)
Distrito Federal	1962	158	8,1	(6,6-9,5)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

*Nota: * Consumo de álcool é considerado de risco se superior a duas doses por dia para homens ou superior a uma dose por dia para mulheres.*

+ O número de entrevistados que referiram ter consumido álcool em doses de risco nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 9.5. Prevalência e posição relativa da capital para consumo de álcool nos últimos 30 dias e consumo considerado de risco*, na população de estudo de 15 anos ou mais, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Região	Capital	Consumo nos últimos 30 dias		Consumo de risco	
		%	Ordem	%	Ordem
Sul	Florianópolis	58,6	18	4,7	2
	Porto Alegre	56,6	17	7,3	7
	Curitiba	49,0	12	4,6	1
Sudeste	Belo Horizonte	51,9	15	10,9	14
	Vitória	53,4	16	12,4	17
	Rio de Janeiro	46,7	11	9,3	12
	São Paulo	44,9	6	4,9	3
Nordeste	Aracaju	50,0	14	7,8	10
	Recife	45,9	9	12,2	16
	Fortaleza	45,2	7	11,1	15
	Natal	39,0	4	9,7	13
	São Luís	41,3	5	12,7	18
	João Pessoa	32,4	1	7,7	9
Centro-Oeste	Campo Grande	49,9	13	6,7	5
	Distrito Federal	46,4	10	8,1	11
Norte	Palmas	45,7	8	6,6	4
	Belém	38,8	3	7,0	6
	Manaus	34,2	2	7,5	8

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: * Consumo de álcool é considerado de risco se superior a duas doses por dia para homens ou superior a uma dose por dia para mulheres.

Tabela 10.1. Percentual de mulheres que referiram ter realizado pelo menos um exame Papanicolaou nos últimos três anos anteriores à pesquisa, na população de estudo de 25 a 59 anos, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total	Realizaram Papanicolaou		
		n	%	IC _{95%}
Manaus	550	465	84,5	(81,4-87,7)
Belém	480	382	79,6	(76,0-83,1)
Palmas	394	327	83,0	(79,5-86,5)
São Luís	575	508	88,3	(85,8-90,9)
Fortaleza	760	615	80,9	(78,0-83,8)
Natal	265	216	81,5	(76,8-86,3)
João Pessoa	440	323	73,4	(68,1-78,7)
Recife	342	277	81,0	(76,5-85,5)
Aracaju	300	239	79,7	(75,1-84,3)
Belo Horizonte	781	643	82,3	(78,9-85,7)
Vitória	267	248	92,9	(89,1-96,6)
Rio de Janeiro	987	824	83,5	(81,2-85,8)
São Paulo	447	364	81,4	(77,6-85,3)
Curitiba	844	729	86,4	(84,1-88,6)
Florianópolis	294	251	85,4	(80,5-90,3)
Porto Alegre	463	401	86,6	(83,4-89,8)
Campo Grande	239	210	87,9	(82,7-93,0)
Distrito Federal	684	557	81,4	(78,2-84,7)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 10.2. Percentual de mulheres que referiram ter realizado pelo menos um exame Papanicolaou nos últimos três anos anteriores à pesquisa, na população de estudo de 25 a 59 anos, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	25 a 34 anos				35 a 49 anos				50 a 59 anos			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	247	208	84,2	(79,7-88,7)	236	208	88,1	(84,2-92,1)	67	49 ⁺	73,1	(62,8-83,4)
Belém	194	148	76,3	(69,9-82,6)	206	168	81,6	(76,4-86,7)	80	66	82,5	(74,6-90,4)
Palmas	206	167	81,1	(77,1-82,0)	149	130	87,2	(81,8-92,7)	39 ⁺	30 ⁺	76,9	(64,1-89,7)
São Luís	267	230	86,1	(81,6-90,7)	219	203	92,7	(89,5-95,9)	89	75	84,3	(75,9-92,6)
Fortaleza	288	232	80,6	(76,0-85,1)	338	282	83,4	(79,4-87,5)	134	101	75,4	(67,7-83,0)
Natal	88	75	85,2	(78,0-92,5)	130	106	81,5	(75,6-87,5)	47	35 ⁺	74,5	(62,0-87,0)
João Pessoa	171	121	70,8	(63,6-77,9)	193	146	75,6	(68,6-82,7)	76	56	73,7	(62,9-84,5)
Recife	110	90	81,8	(74,6-89,0)	159	131	82,4	(76,8-88,0)	73	56	76,7	(66,6-86,8)
Aracaju	111	78	70,3	(62,1-78,4)	135	119	88,1	(81,9-94,4)	54	42 ⁺	77,8	(66,8-88,8)
Belo Horizonte	289	224	77,5	(71,9-83,1)	350	305	87,1	(83,4-90,8)	142	114	80,3	(72,4-88,1)
Vitória	94	85	90,4	(84,6-96,3)	115	113	98,3	(95,0-100,0)	58	50	86,2	(76,1-96,3)
Rio de Janeiro	300	253	84,3	(80,2-88,4)	453	388	85,7	(81,9-89,4)	234	183	78,2	(72,3-84,1)
São Paulo	157	129	82,2	(76,0-88,4)	197	165	83,8	(78,3-89,2)	93	70	75,3	(67,0-83,6)
Curitiba	289	252	87,2	(83,2-91,2)	397	352	88,7	(85,5-91,8)	158	125	79,1	(72,7-85,5)
Florianópolis	93	83	89,2	(82,6-95,9)	128	112	87,5	(79,7-95,3)	73	56	76,7	(66,1-87,3)
Porto Alegre	138	119	86,2	(80,2-92,2)	218	191	87,6	(82,5-92,7)	107	91	85,0	(77,7-92,4)
Campo Grande	75	71	94,7	(89,6-99,7)	114	100	87,7	(80,4-95,1)	50	39 ⁺	78,0	(66,7-89,3)
Distrito Federal	267	218	81,6	(76,6-86,7)	309	259	83,8	(79,9-87,7)	108	80	74,1	(66,0-82,2)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistadas que referiram ter realizado pelo menos um exame Papanicolaou nos últimos três anos nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 10.3. Percentual de mulheres que referiram ter realizado pelo menos um exame Papanicolaou nos últimos três anos anteriores à pesquisa, na população de estudo de 25 a 59 anos, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	214	163	76,2	(70,8-81,6)	331	299	90,3	(86,9-93,8)
Belém	168	123	73,2	(66,1-80,3)	309	256	82,8	(78,8-86,9)
Palmas	139	109	78,4	(70,4-86,5)	251	214	85,3	(81,1-89,4)
São Luís	171	145	84,8	(80,9-88,7)	400	359	89,8	(86,6-92,9)
Fortaleza	318	235	73,9	(68,9-78,9)	422	363	86,0	(82,4-89,7)
Natal	120	90	75,0	(67,1-82,9)	133	116	87,2	(81,6-92,8)
João Pessoa	186	120	64,5	(56,6-72,4)	251	201	80,1	(74,3-85,8)
Recife	140	111	79,3	(72,5-86,1)	190	154	81,1	(76,0-86,1)
Aracaju	119	99	83,2	(77,0-89,3)	174	136	78,2	(70,5-85,8)
Belo Horizonte	327	247	75,5	(70,9-80,2)	439	385	87,7	(84,2-91,2)
Vitória	63	55	87,3	(79,4-95,2)	201	190	94,5	(91,0-98,1)
Rio de Janeiro	282	199	70,6	(65,8-75,3)	692	617	89,2	(87,0-91,3)
São Paulo	175	128	73,1	(67,1-79,1)	255	222	87,1	(82,4-91,7)
Curitiba	268	217	81,0	(76,4-85,5)	525	468	89,1	(86,6-91,7)
Florianópolis	84	63	75,0	(67,4-82,6)	198	178	89,9	(85,1-94,7)
Porto Alegre	141	111	78,7	(71,8-85,7)	316	285	90,2	(87,3-93,1)
Campo Grande	83	68	81,9	(72,5-91,4)	145	133	91,7	(86,9-96,5)
Distrito Federal	236	165	69,9	(64,1-75,8)	436	381	87,4	(83,8-90,9)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 10.4. Distribuição de mulheres que realizaram pelo menos um exame Papanicolaou nos últimos três anos anteriores à pesquisa, na população de estudo de 25 a 59 anos, por local onde o último exame foi realizado (Rede SUS/Não-SUS), em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total	Rede de Assistência					
		SUS			Não SUS		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	465	295	63,4	(57,6-69,3)	170	36,6	(30,7-42,4)
Belém	382	205	53,7	(45,9-61,4)	177	46,3	(38,6-54,1)
Palmas	327	204	62,4	(52,3-72,5)	123	37,6	(27,5-47,7)
São Luís	508	333	65,6	(57,4-73,7)	175	34,4	(26,3-42,6)
Fortaleza	615	325	52,8	(45,2-60,5)	290	47,2	(39,5-54,8)
Natal	216	109	50,5	(42,7-58,3)	107	49,5	(41,7-57,3)
João Pessoa	323	174	53,9	(43,3-64,4)	149	46,1	(35,6-56,7)
Recife	277	140	50,5	(41,3-59,8)	137	49,5	(40,2-58,7)
Aracaju	239	129	54,0	(43,1-64,8)	110	46,0	(35,2-56,9)
Belo Horizonte	643	306	47,6	(40,8-54,4)	337	52,4	(45,6-59,2)
Vitória	248	98	39,5	(28,3-50,7)	150	60,5	(49,3-71,7)
Rio de Janeiro	824	264	32,0	(26,2-37,9)	560	68,0	(62,1-73,8)
São Paulo	364	158	43,4	(36,7-50,1)	206	56,6	(49,9-63,3)
Curitiba	729	325	44,6	(38,3-50,8)	404	55,4	(49,2-61,7)
Florianópolis	251	87	34,7	(25,7-43,6)	164	65,3	(56,4-74,3)
Porto Alegre	401	158	39,4	(31,4-47,4)	243	60,6	(52,6-68,6)
Campo Grande	210	100	47,6	(38,3-56,9)	110	52,4	(43,1-61,7)
Distrito Federal	557	245	44,0	(36,4-51,6)	312	56,0	(48,4-63,6)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 10.5. Percentual de mulheres que realizaram exame clínico das mamas e mamografia nos últimos dois anos anteriores à pesquisa, na população de estudo de 50 a 69 anos, por tipo de exame, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total	Exames das Mamas					
		Exame clínico das mamas			Mamografia		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	123	49 ⁺	39,8	(29,8-49,9)	52	42,3	(34,2-50,4)
Belém	133	58	43,6	(34,3-52,9)	49 ⁺	36,8	(28,5-45,2)
Palmas	47 ⁺	28 ⁺	59,6	(41,4-77,8)	18 ⁺	38,3	(19,4-57,2)
São Luís	140	90	64,3	(54,0-74,5)	85	60,7	(49,0-72,5)
Fortaleza	226	134	59,3	(52,2-66,3)	106	46,9	(39,4-54,4)
Natal	81	45 ⁺	55,6	(41,1-70,0)	38 ⁺	46,9	(32,5-61,3)
João Pessoa	128	75	58,6	(46,2-71,0)	67	52,3	(40,1-64,6)
Recife	125	78	62,4	(53,2-71,6)	64	51,2	(40,9-61,5)
Aracaju	83	47 ⁺	56,6	(44,7-68,6)	40 ⁺	48,2	(37,3-59,0)
Belo Horizonte	236	180	76,3	(70,7-81,8)	159	67,4	(61,3-73,5)
Vitória	85	69	81,2	(72,6-89,8)	65	76,5	(67,2-85,7)
Rio de Janeiro	397	271	68,3	(63,1-73,4)	197	49,6	(43,1-56,2)
São Paulo	127	78	61,4	(52,6-70,2)	75	59,1	(49,7-68,4)
Curitiba	238	153	64,3	(57,7-70,8)	123	51,7	(44,5-58,9)
Florianópolis	111	77	69,4	(61,1-77,6)	70	63,1	(54,1-72,0)
Porto Alegre	186	134	72,0	(65,4-78,7)	130	69,9	(62,5-77,3)
Campo Grande	79	50	63,3	(53,8-72,8)	44 ⁺	55,7	(44,5-66,9)
Distrito Federal	167	105	62,9	(54,6-71,2)	82	49,1	(40,5-57,7)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistadas que referiram ter realizado exame das mamas nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 10.6. Percentual de mulheres que realizaram exame clínico das mamas e mamografia nos últimos dois anos anteriores à pesquisa, na população de estudo de 50 a 69 anos, por tipo de exame e escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental	Total	Exames das Mamas					
			Exame clínico das mamas			Mamografia		
			n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	incompleto	91	29 ⁺	31,9	(20,1-43,6)	28 ⁺	30,8	(21,6-40,0)
	completo e mais	30 ⁺	19 ⁺	63,3	(46,7-80,0)	23 ⁺	76,7	(59,6-93,8)
Belém	incompleto	74	23 ⁺	31,1	(20,8-41,4)	18 ⁺	24,3	(16,3-32,3)
	completo e mais	57	34 ⁺	59,6	(43,6-75,7)	30 ⁺	52,6	(36,7-68,6)
Palmas	incompleto	34 ⁺	17 ⁺	50,0	(29,8-70,2)	7 ⁺	20,6	(41,4-37,0)
	completo e mais	13 ⁺	11 ⁺	84,6	(64,2-100,0)	11 ⁺	84,6	(62,2-100,0)
São Luís	incompleto	71	33 ⁺	46,5	(35,2-57,8)	30 ⁺	42,3	(29,5-55,0)
	completo e mais	69	57	82,6	(73,4-91,8)	55	79,7	(69,9-89,6)
Fortaleza	incompleto	123	65	52,8	(44,0-61,7)	41 ⁺	33,3	(24,0-42,6)
	completo e mais	98	67	68,4	(59,0-77,8)	63	64,3	(55,2-73,3)
Natal	incompleto	58	24 ⁺	41,4	(26,6-56,2)	20 ⁺	34,5	(19,9-49,0)
	completo e mais	19 ⁺	18 ⁺	94,7	(84,4-100,0)	15 ⁺	79,0	(61,4-96,5)
João Pessoa	incompleto	70	28 ⁺	40,0	(28,1-51,9)	23 ⁺	32,9	(22,1-43,6)
	completo e mais	57	47 ⁺	82,5	(70,8-94,2)	44 ⁺	77,2	(64,9-89,5)
Recife	incompleto	62	30 ⁺	48,4	(36,8-60,0)	24 ⁺	38,7	(27,8-49,6)
	completo e mais	56	43 ⁺	76,8	(65,7-87,9)	36 ⁺	64,3	(49,7-78,9)
Aracaju	incompleto	57	28 ⁺	49,1	(37,6-60,6)	26 ⁺	45,6	(33,0-58,2)
	completo e mais	26	19 ⁺	73,1	(53,3-92,8)	14 ⁺	53,8	(35,4-72,3)
Belo Horizonte	incompleto	132	89	67,4	(59,5-75,3)	75	56,8	(48,5-65,1)
	completo e mais	98	85	86,7	(79,8-93,6)	78	79,6	(70,9-88,3)
Vitória	incompleto	34 ⁺	25 ⁺	73,5	(57,0-90,1)	22 ⁺	64,7	(48,3-81,1)
	completo e mais	47 ⁺	40 ⁺	85,1	(77,2-93,6)	39 ⁺	83,0	(73,5-92,5)
Rio de Janeiro	incompleto	185	112	60,5	(52,4-68,6)	68	36,8	(28,5-45,0)
	completo e mais	204	152	74,5	(68,3-80,7)	123	60,3	(53,2-67,4)
São Paulo	incompleto	76	40 ⁺	52,6	(41,7-63,6)	35 ⁺	46,1	(33,7-58,4)
	completo e mais	46 ⁺	35 ⁺	76,1	(63,0-89,2)	37 ⁺	80,4	(67,4-93,5)
Curitiba	incompleto	128	67	52,3	(43,7-61,0)	53	41,4	(32,8-50,0)
	completo e mais	96	74	77,1	(69,0-85,2)	60	63,0	(52,4-72,6)
Florianópolis	incompleto	58	36 ⁺	62,1	(50,4-73,8)	28 ⁺	48,3	(38,0-58,5)
	completo e mais	45 ⁺	36 ⁺	80,0	(68,3-91,7)	36 ⁺	80,0	(68,0-92,0)
Porto Alegre	incompleto	87	53	60,9	(50,9-70,9)	54	62,1	(51,4-72,7)
	completo e mais	95	77	81,1	(73,5-88,6)	72	75,8	(66,8-84,8)
Campo Grande	incompleto	53	36 ⁺	67,9	(55,7-80,2)	30 ⁺	56,6	(42,3-70,9)
	completo e mais	21 ⁺	12 ⁺	57,1	(40,8-73,5)	12 ⁺	57,1	(40,8-73,5)
Distrito Federal	incompleto	94	49 ⁺	52,1	(42,2-62,1)	35 ⁺	37,2	(26,2-48,2)
	completo e mais	71	56	78,9	(69,5-88,2)	47 ⁺	66,2	(57,6-74,8)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistadas que referiram ter realizado exame da mamas nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 10.7. Distribuição de mulheres que realizaram exame clínico das mamas nos últimos dois anos, na população de estudo de 50 a 69 anos, por local onde o último exame foi realizado (Rede SUS/Não-SUS), em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de entrevistadas que fizeram o exame	Rede de Assistência					
		SUS			Não SUS		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	49 ⁺	26 ⁺	53,1	(42,3-63,8)	23 ⁺	46,9	(36,2-57,7)
Belém	58	16 ⁺	27,6	(13,3-41,9)	42 ⁺	72,4	(58,1-86,7)
Palmas	28	14 ⁺	50,0	(28,1-71,9)	14 ⁺	50,0	(28,1-71,9)
São Luís	90	42 ⁺	46,7	(32,7-60,7)	48 ⁺	53,3	(39,3-67,3)
Fortaleza	134	59	44,0	(34,7-53,4)	75	56,0	(46,6-65,3)
Natal	45 ⁺	18 ⁺	40,0	(20,3-59,7)	27 ⁺	60,0	(40,3-79,7)
João Pessoa	75	22 ⁺	29,3	(14,0-44,6)	53	70,7	(55,4-86,0)
Recife	78	27 ⁺	34,6	(22,9-46,3)	51	65,4	(53,7-77,1)
Aracaju	47 ⁺	18 ⁺	38,3	(24,1-52,5)	29 ⁺	61,7	(47,5-75,9)
Belo Horizonte	180	69	38,3	(28,5-48,2)	111	61,7	(51,8-71,5)
Vitória	69	22 ⁺	31,9	(19,3-44,5)	47 ⁺	68,1	(55,5-80,7)
Rio de Janeiro	271	75	27,7	(19,1-36,3)	196	72,3	(63,7-80,9)
São Paulo	78	38 ⁺	48,7	(36,3-61,2)	40 ⁺	51,3	(38,8-63,7)
Curitiba	153	69	45,1	(36,4-53,8)	84	54,9	(46,2-63,6)
Florianópolis	77	37 ⁺	48,0	(34,7-61,4)	40 ⁺	52,0	(38,6-65,3)
Porto Alegre	134	46 ⁺	34,3	(24,3-44,3)	88	65,7	(55,7-75,7)
Campo Grande	50	27 ⁺	54,0	(39,1-68,9)	23 ⁺	46,0	(31,1-60,9)
Distrito Federal	105	37 ⁺	35,2	(23,3-47,1)	68	64,8	(52,9-76,7)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistadas que referiram ter realizado exame clínico das mamas nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 10.8. Distribuição de mulheres que realizaram mamografia nos últimos dois anos, na população de estudo de 50 a 69 anos, por local onde o último exame foi realizado (Rede SUS/Não-SUS), em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de entrevistadas que fizeram o exame	Rede de Assistência					
		SUS			Não SUS		
		n	%	IC _{95%}	n	%	IC _{95%}
Manaus	52	28 ⁺	53,9	(39,7-68,0)	24 ⁺	46,2	(32,0-60,3)
Belém	49 ⁺	15 ⁺	30,6	(14,3-46,9)	34 ⁺	69,4	(53,1-85,7)
Palmas	18 ⁺	5 ⁺	27,8	(56,7-50,0)	13 ⁺	72,2	(50,1-94,4)
São Luís	85	41 ⁺	48,2	(33,7-62,8)	44 ⁺	51,8	(37,2-66,3)
Fortaleza	106	33 ⁺	31,1	(20,9-41,4)	73	68,9	(58,6-79,1)
Natal	38 ⁺	14 ⁺	36,8	(16,4-57,3)	24 ⁺	63,2	(42,7-83,6)
João Pessoa	67	18 ⁺	26,9	(11,8-41,9)	49 ⁺	73,1	(58,1-88,2)
Recife	64	19 ⁺	29,7	(17,8-41,6)	45 ⁺	70,3	(58,4-82,2)
Aracaju	40 ⁺	12 ⁺	30,0	(15,9-44,1)	28 ⁺	70,0	(55,9-84,1)
Belo Horizonte	159	58	36,5	(27,0-46,0)	101	63,5	(54,0-73,0)
Vitória	65	20 ⁺	30,8	(18,5-43,1)	45 ⁺	69,2	(56,9-81,5)
Rio de Janeiro	197	34 ⁺	17,3	(10,3-24,2)	163	82,7	(75,8-89,7)
São Paulo	75	35 ⁺	46,7	(34,1-59,2)	40 ⁺	53,3	(40,8-65,9)
Curitiba	123	52	42,3	(32,5-52,0)	71	57,7	(48,0-67,5)
Florianópolis	70	27 ⁺	38,6	(26,6-50,6)	43 ⁺	61,4	(49,4-73,4)
Porto Alegre	130	46 ⁺	35,4	(25,1-45,7)	84	64,6	(54,3-75,0)
Campo Grande	44 ⁺	22 ⁺	50,0	(33,0-67,0)	22 ⁺	50,0	(33,0-67,0)
Distrito Federal	82	18 ⁺	22,0	(11,7-32,3)	64	78,0	(67,7-88,3)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistadas que referiram ter realizado mamografia nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 11.1. Percentual de indivíduos que referiram ter medido a pressão arterial nos últimos dois anos, na população de estudo de 25 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	25 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	630	462	73,3	(69,2-77,5)	396	352	88,9	(85,6-92,1)	142	132	93,0	(89,1-96,8)
Belém	476	314	66,0	(61,2-70,7)	358	314	87,7	(84,0-91,4)	145	139	95,9	(92,7-99,0)
Palmas	498	452	90,8	(87,8-93,7)	266	251	94,4	(91,6-97,1)	47 ⁺	46 ⁺	97,9	(93,5-100,0)
São Luís	619	456	73,7	(69,9-77,4)	405	366	90,4	(87,3-93,5)	135	127	94,1	(89,3-98,8)
Fortaleza	761	604	79,4	(76,6-82,2)	588	513	87,2	(84,1-90,4)	270	254	94,1	(90,9-97,2)
Natal	267	203	76,0	(69,0-83,1)	208	193	92,8	(88,8-96,8)	95	88	92,6	(87,8-97,4)
João Pessoa	422	310	73,5	(67,9-79,0)	324	298	92,0	(88,5-95,4)	140	132	94,3	(90,0-98,6)
Recife	301	238	79,1	(73,2-84,9)	314	290	92,4	(89,5-95,2)	147	140	95,2	(92,0-98,5)
Aracaju	294	240	81,6	(76,3-86,9)	216	198	91,7	(88,3-95,1)	83	78	94,0	(88,7-99,2)
Belo Horizonte	794	684	86,1	(83,3-88,9)	629	584	92,8	(90,6-95,1)	269	260	96,7	(94,4-99,0)
Vitória	224	200	89,3	(84,8-93,7)	260	250	96,2	(93,9-98,4)	83	81	97,6	(93,0-100,0)
Rio de Janeiro	760	649	85,4	(82,9-87,9)	935	854	91,3	(89,4-93,2)	460	436	94,8	(92,9-96,7)
São Paulo	394	326	82,7	(78,4-87,1)	372	343	92,2	(89,7-94,7)	118	114	96,6	(92,6-100,0)
Curitiba	836	751	89,8	(87,8-91,9)	697	663	95,1	(93,4-96,8)	242	235	97,1	(95,0-99,2)
Florianópolis	258	221	85,7	(81,6-89,7)	287	265	92,3	(89,1-95,6)	112	106	94,6	(91,1-98,2)
Porto Alegre	392	339	86,5	(83,5-89,5)	447	413	92,4	(89,8-95,0)	236	228	96,6	(94,2-99,0)
Campo Grande	206	189	91,7	(87,7-95,8)	216	206	95,4	(92,0-98,8)	69	67	97,1	(93,1-100,0)
Distrito Federal	718	611	85,1	(82,1-88,1)	525	495	94,3	(92,2-96,3)	154	148	96,1	(92,8-99,4)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 11.2. Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de hipertensão em pelo menos uma consulta, entre os que referiram ter realizado exame para medir a pressão arterial nos últimos dois anos, na população de estudo de 25 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	25 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	470	70	14,9	(11,8-18,0)	354	92	26,0	(21,6-30,4)	133	55	41,4	(32,0-50,7)
Belém	321	30 ⁺	9,3	(6,0-12,7)	316	83	26,3	(21,8-30,8)	141	55	39,0	(31,7-46,3)
Palmas	453	42 ⁺	9,3	(6,5-12,0)	253	60	23,7	(18,8-28,6)	46 ⁺	25 ⁺	54,3	(39,6-69,1)
São Luís	460	50	10,9	(7,9-13,9)	368	108	29,3	(24,1-34,6)	128	63	49,2	(41,1-57,3)
Fortaleza	609	85	14,0	(10,8-17,1)	517	159	30,8	(26,5-35,1)	255	119	46,7	(40,8-52,4)
Natal	206	29 ⁺	14,1	(8,4-19,8)	195	61	31,3	(26,6-,36,0)	89	37 ⁺	41,6	(32,3-50,9)
João Pessoa	313	31 ⁺	9,9	(6,2-13,6)	300	81	27,0	(21,8-32,2)	132	52	39,4	(29,6-49,2)
Recife	239	35 ⁺	14,6	(10,0-19,3)	293	96	32,8	(27,9-37,7)	142	68	47,9	(39,9-55,9)
Aracaju	242	25 ⁺	10,3	(6,2-14,4)	199	63	31,7	(26,1-37,2)	78	46 ⁺	59,0	(45,6-72,3)
Belo Horizonte	690	68	9,9	(7,6-12,1)	592	192	32,4	(28,5-36,4)	263	138	52,5	(46,4-58,6)
Vitória	201	22 ⁺	10,9	(5,7-16,2)	252	81	32,1	(24,8-39,5)	81	39 ⁺	48,1	(35,7-60,6)
Rio de Janeiro	653	88	13,5	(10,7-16,2)	866	294	33,9	(30,9-37,0)	441	225	51,0	(46,1-56,0)
São Paulo	332	42 ⁺	12,7	(9,4-15,9)	346	126	36,4	(31,0-41,8)	115	64	55,7	(45,2-66,1)
Curitiba	757	111	14,7	(11,7-17,6)	670	202	30,1	(26,3-34,0)	236	124	52,5	(45,2-59,8)
Florianópolis	224	27 ⁺	12,1	(8,2-15,9)	265	75	28,3	(20,5-36,1)	107	63	58,9	(48,0-69,8)
Porto Alegre	343	54	15,7	(11,9-19,6)	418	140	33,5	(28,4-38,6)	229	105	45,9	(38,9-52,8)
Campo Grande	190	14 ⁺	7,4	(3,4-11,3)	206	69	33,5	(27,3-39,7)	67	36 ⁺	53,7	(42,3-65,1)
Distrito Federal	617	73	11,8	(9,2-14,4)	496	156	31,5	(27,5-35,4)	150	74	49,3	(42,6-56,1)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter diagnóstico clínico de hipertensão nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 11.3. Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de hipertensão em pelo menos uma consulta, entre os que referiram ter realizado exame para medir a pressão arterial nos últimos dois anos, na população de estudo de 25 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	418	127	30,4	(25,7-35,0)	527	87	16,5	(13,8-19,2)
Belém	315	79	25,1	(19,6-30,5)	459	88	19,2	(15,8-22,5)
Palmas	284	72	25,4	(20,4-30,3)	451	51	11,3	(8,6-14,0)
São Luís	350	107	30,6	(25,5-35,7)	599	114	19,0	(15,6-22,5)
Fortaleza	626	195	31,2	(27,1-35,2)	732	162	22,1	(18,9-25,3)
Natal	238	74	31,1	(25,3-36,9)	236	47 ⁺	19,9	(15,2-24,6)
João Pessoa	336	87	25,9	(21,0-30,8)	404	76	18,8	(14,2-23,4)
Recife	281	97	34,5	(28,2-40,8)	357	95	26,6	(21,7-31,5)
Aracaju	225	73	32,4	(25,2-39,7)	280	58	20,7	(15,6-25,8)
Belo Horizonte	691	235	34,0	(29,9-38,1)	818	157	19,2	(16,4-22,0)
Vitória	141	63	44,7	(35,2-54,1)	382	75	19,6	(15,2-24,1)
Rio de Janeiro	588	254	43,2	(38,8-47,6)	1323	334	25,2	(23,2-27,3)
São Paulo	347	140	40,3	(35,8-44,8)	414	80	19,3	(15,4-23,2)
Curitiba	584	193	33,0	(27,9-38,2)	991	218	22,0	(19,2-24,8)
Florianópolis	206	83	40,3	(31,7-48,9)	370	72	19,5	(15,1-23,8)
Porto Alegre	323	148	45,8	(40,3-51,3)	652	148	22,7	(18,8-26,6)
Campo Grande	193	71	36,8	(29,1-44,5)	244	44 ⁺	18,0	(12,5-23,6)
Distrito Federal	457	152	33,3	(28,9-37,6)	781	141	18,1	(15,7-20,4)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter diagnóstico clínico de hipertensão nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 12.1. Percentual de indivíduos que referiram ter realizado exame para medir o açúcar no sangue ou diagnosticar diabetes, na população de estudo de 25 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	25 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	630	278	44,1	(38,3-49,9)	396	302	76,3	(70,8-81,8)	142	117	82,4	(77,4-87,4)
Belém	476	168	35,3	(30,4-40,2)	358	252	70,4	(65,1-75,7)	145	127	87,6	(82,4-92,8)
Palmas	498	221	44,4	(36,9-51,9)	266	195	73,3	(67,0-79,6)	47 ⁺	40 ⁺	85,1	(72,6-97,7)
São Luís	619	261	42,2	(36,5-47,8)	405	294	72,6	(66,6-78,6)	135	105	77,8	(70,5-85,0)
Fortaleza	761	294	38,6	(34,6-42,7)	588	413	70,2	(65,6-74,9)	270	212	78,5	(72,2-84,9)
Natal	267	107	40,1	(32,0-48,1)	208	157	75,5	(69,6-81,4)	95	75	78,9	(70,6-87,3)
João Pessoa	422	207	49,1	(43,0-55,1)	324	251	77,5	(71,7-83,2)	140	115	82,1	(75,7-88,6)
Recife	301	134	44,5	(37,5-51,5)	314	253	80,6	(75,0-86,1)	147	132	89,8	(84,8-94,8)
Aracaju	294	172	58,5	(52,7-64,3)	216	181	83,8	(77,9-89,7)	83	74	89,2	(83,2-95,1)
Belo Horizonte	794	427	53,8	(48,6-58,9)	629	517	82,2	(78,1-86,2)	268	238	88,8	(84,9-92,7)
Vitória	224	127	56,7	(49,3-64,1)	260	218	83,8	(77,8-89,9)	83	72	86,7	(81,8-91,7)
Rio de Janeiro	760	471	62,0	(57,3-66,7)	935	743	79,5	(76,1-82,8)	460	403	87,6	(84,0-91,2)
São Paulo	394	225	57,1	(50,8-63,4)	372	297	79,8	(75,3-84,4)	118	107	90,7	(85,4-96,0)
Curitiba	836	506	60,5	(57,3-63,8)	697	595	85,4	(82,5-88,2)	242	215	88,8	(85,0-92,7)
Florianópolis	258	152	58,9	(53,5-64,4)	287	228	79,4	(73,4-85,5)	112	99	88,4	(82,3-94,5)
Porto Alegre	392	233	59,4	(55,3-63,6)	447	360	80,5	(76,3-84,8)	236	216	91,5	(87,6-95,4)
Campo Grande	206	102	49,5	(41,5-57,5)	216	162	75,0	(68,7-81,3)	69	57	82,6	(73,9-91,3)
Distrito Federal	718	362	50,4	(44,9-55,9)	525	433	82,5	(78,8-86,1)	154	134	87,0	(82,1-92,0)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 12.2. Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de diabetes, entre aqueles que referiram ter realizado exame para diagnosticar diabetes, na população de estudo de 25 anos ou mais, por sexo, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	697	65	9,3	(7,5-11,1)	261	26 ⁺	10,0	(6,1-13,9)	436	39 ⁺	8,9	(6,5-11,4)
Belém	547	47 ⁺	8,6	(6,5-10,7)	188	18 ⁺	9,6	(5,5-13,7)	359	29 ⁺	8,1	(5,7-10,5)
Palmas	456	15 ⁺	3,3	(1,6-5,0)	213	6 ⁺	2,8	(0,3-5,3)	243	9 ⁺	3,7	(1,1-6,3)
São Luís	660	43 ⁺	6,5	(4,6-8,5)	228	20 ⁺	8,8	(4,6-12,9)	432	23 ⁺	5,3	(3,6-7,1)
Fortaleza	919	82	8,9	(6,9-11,0)	339	36 ⁺	10,6	(7,9-13,3)	580	46 ⁺	7,9	(5,3-10,6)
Natal	339	29 ⁺	8,6	(5,2-11,9)	120	14 ⁺	11,7	(5,7-17,6)	219	15 ⁺	6,8	(3,4-10,3)
João Pessoa	573	30 ⁺	5,2	(3,1-7,3)	205	10 ⁺	4,9	(2,1-7,7)	368	20 ⁺	5,4	(2,9-7,9)
Recife	519	37 ⁺	7,1	(4,8-9,5)	193	13 ⁺	6,7	(3,5-10,0)	326	24 ⁺	7,4	(4,6-10,1)
Aracaju	427	28 ⁺	6,6	(4,6-8,5)	165	9 ⁺	5,5	(2,5-8,4)	262	19 ⁺	7,3	(4,3-10,2)
Belo Horizonte	1182	64	5,4	(4,0-6,8)	446	28 ⁺	6,3	(4,1-8,5)	736	36 ⁺	4,9	(3,2-6,6)
Vitória	417	32 ⁺	7,7	(4,8-10,5)	171	12 ⁺	7,0	(3,4-10,7)	246	20 ⁺	8,1	(4,5-11,8)
Rio de Janeiro	1617	129	8,0	(6,7-9,3)	592	61	10,3	(8,2-12,4)	1025	68	6,6	(5,2-8,1)
São Paulo	629	59	9,4	(6,9-11,8)	234	28 ⁺	12,0	(7,6-16,3)	395	31 ⁺	7,8	(5,2-10,5)
Curitiba	1316	97	7,4	(5,6-9,2)	513	37 ⁺	7,2	(4,6-9,9)	803	60	7,5	(5,4-9,5)
Florianópolis	479	35 ⁺	7,3	(4,9-9,8)	180	14 ⁺	7,8	(4,4-11,2)	299	21 ⁺	7,0	(4,0-10,0)
Porto Alegre	809	61	7,5	(5,8-9,3)	298	19 ⁺	6,4	(3,9-8,8)	511	42 ⁺	8,2	(6,0-10,5)
Campo Grande	321	22 ⁺	6,9	(3,4-10,3)	116	6 ⁺	5,2	(1,6-8,8)	205	16 ⁺	7,8	(3,7-11,9)
Distrito Federal	929	52	5,6	(4,2-7,0)	375	19 ⁺	5,1	(3,0-7,2)	554	33 ⁺	6,0	(3,9-8,0)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter diagnóstico clínico de diabetes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 12.3. Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de diabetes, entre aqueles que referiram ter realizado exame para diagnosticar diabetes, na população de estudo de 25 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	25 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	278	13 ⁺	4,7	(2,5-6,8)	302	25 ⁺	8,3	(5,2-11,3)	117	27 ⁺	23,1	(14,4-31,7)
Belém	168	5 ⁺	3,0	(0,6-5,3)	252	16 ⁺	6,3	(3,4-9,3)	127	26 ⁺	20,5	(13,7-27,3)
Palmas	221	2 ⁺	0,9	(0,4-2,2)	195	7 ⁺	3,6	(1,1-6,1)	40 ⁺	6 ⁺	15,0	(2,4-27,6)
São Luís	261	5 ⁺	1,9	(0,3-3,6)	294	17 ⁺	5,8	(2,8-8,8)	105	21 ⁺	20,0	(12,1-27,9)
Fortaleza	294	7 ⁺	2,4	(0,7-4,1)	413	31 ⁺	7,5	(4,7-10,3)	212	44 ⁺	20,8	(14,3-27,2)
Natal	107	2 ⁺	1,9	(0,0-4,5)	157	13 ⁺	8,3	(3,7-12,9)	75	14 ⁺	18,7	(11,2-26,2)
João Pessoa	207	1 ⁺	0,5	(0,0-1,4)	251	14 ⁺	5,6	(2,5-8,7)	115	15 ⁺	13,0	(6,9-19,2)
Recife	134	1 ⁺	0,7	(0,0-2,2)	253	19 ⁺	7,5	(4,3-10,7)	132	17 ⁺	12,9	(6,6-19,2)
Aracaju	172	7 ⁺	4,1	(1,3-6,8)	181	11 ⁺	6,1	(3,0-9,2)	74	10 ⁺	13,5	(4,8-22,2)
Belo Horizonte	427	6 ⁺	1,4	(0,3-2,5)	517	26 ⁺	5,0	(3,3-6,7)	238	32 ⁺	13,4	(8,8-18,1)
Vitória	127	0 ⁺	0,0	-	218	17 ⁺	7,8	(3,9-11,7)	72	15 ⁺	20,8	(10,5-31,2)
Rio de Janeiro	471	7 ⁺	1,5	(0,4-2,5)	743	57	7,7	(5,7-9,7)	403	65	16,1	(12,3-20,0)
São Paulo	225	4 ⁺	1,8	(0,1-3,5)	297	28 ⁺	9,4	(6,1-12,7)	107	27 ⁺	25,2	(17,3-33,2)
Curitiba	506	8 ⁺	1,6	(0,6-2,6)	595	48 ⁺	8,1	(5,7-10,5)	215	41 ⁺	19,1	(13,5-24,6)
Florianópolis	152	1 ⁺	0,7	(0,0-1,9)	228	15 ⁺	6,6	(4,1-9,0)	99	19 ⁺	19,2	(11,6-26,8)
Porto Alegre	233	8 ⁺	3,4	(1,2-5,7)	360	28 ⁺	7,8	(5,2-10,3)	216	25 ⁺	11,6	(7,0-16,1)
Campo Grande	102	1 ⁺	1,0	(0,0-2,8)	162	13 ⁺	8,0	(2,5-13,5)	57	8 ⁺	14,0	(3,6-24,5)
Distrito Federal	362	6 ⁺	1,7	(0,2-3,2)	433	30 ⁺	6,9	(4,6-9,2)	134	16 ⁺	11,9	(7,1-16,7)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter diagnóstico clínico de diabetes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 12.4. Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de diabetes, entre aqueles que referiram ter realizado exame para diagnosticar diabetes, na população de estudo de 25 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	305	51	16,7	(12,9-20,6)	381	14 ⁺	3,7	(1,9-5,4)
Belém	224	27 ⁺	12,1	(7,9-16,2)	319	19 ⁺	6,0	(3,5-8,4)
Palmas	147	7 ⁺	4,8	(0,8-8,7)	297	7 ⁺	2,4	(0,7-4,0)
São Luís	217	23 ⁺	10,6	(6,5-14,7)	438	20 ⁺	4,6	(2,3-6,8)
Fortaleza	366	52	14,2	(10,3-18,1)	534	30 ⁺	5,6	(3,4-7,9)
Natal	153	21 ⁺	13,7	(7,6-19,9)	172	7 ⁺	4,1	(1,5-6,6)
João Pessoa	238	21 ⁺	8,8	(4,9-12,7)	331	9 ⁺	2,7	(0,6-4,8)
Recife	201	24 ⁺	11,9	(6,9-16,9)	288	11 ⁺	3,8	(1,9-5,7)
Aracaju	174	16 ⁺	9,2	(5,1-13,3)	240	11 ⁺	4,6	(2,3-6,9)
Belo Horizonte	474	35 ⁺	7,4	(4,8-10,0)	679	28 ⁺	4,1	(2,9-5,3)
Vitória	104	17 ⁺	16,3	(8,2-24,5)	302	13 ⁺	4,3	(1,8-6,8)
Rio de Janeiro	460	60	13,0	(9,9-16,1)	1114	64	5,7	(4,4-7,1)
São Paulo	257	38 ⁺	14,8	(10,8-18,7)	344	21 ⁺	6,1	(3,4-8,8)
Curitiba	461	62	13,4	(9,6-17,3)	789	30 ⁺	3,8	(2,4-5,2)
Florianópolis	151	24 ⁺	15,9	(10,1-21,7)	311	10 ⁺	3,2	(1,6-4,8)
Porto Alegre	247	35 ⁺	14,2	(10,3-18,0)	550	25 ⁺	4,5	(2,7-6,4)
Campo Grande	124	11 ⁺	8,9	(2,8-15,0)	186	11 ⁺	5,9	(2,7-9,2)
Distrito Federal	299	33 ⁺	11,0	(7,8-14,2)	608	17 ⁺	2,8	(1,7-3,9)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter diagnóstico clínico de diabetes nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 13.1. Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de infarto ou ataque do coração ou angina ou doenças das coronárias, na população de estudo de 25 anos ou mais, por sexo, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1168	48 ⁺	4,1	(2,9-5,3)	529	14 ⁺	2,6	(1,4-3,9)	639	34 ⁺	5,3	(3,5-7,1)
Belém	979	28 ⁺	2,9	(1,7-4,0)	408	13 ⁺	3,2	(1,5-4,9)	571	15 ⁺	2,6	(1,2-4,1)
Palmas	811	29 ⁺	3,6	(2,2-4,9)	401	19 ⁺	4,7	(2,2-7,2)	410	10 ⁺	2,4	(1,2-3,7)
São Luís	1159	20 ⁺	1,7	(1,1-2,4)	494	9 ⁺	1,8	(0,6-3,1)	665	11 ⁺	1,7	(0,8-2,5)
Fortaleza	1619	54	3,3	(2,4-4,3)	691	25 ⁺	3,6	(2,3-4,9)	928	29 ⁺	3,1	(2,0-4,3)
Natal	570	31 ⁺	5,4	(3,6-7,3)	244	11 ⁺	4,5	(2,0-7,0)	326	20 ⁺	6,1	(3,7-8,6)
João Pessoa	886	28 ⁺	3,2	(1,8-4,5)	352	8 ⁺	2,3	(0,7-3,9)	534	20 ⁺	3,7	(2,0-5,5)
Recife	762	28 ⁺	3,7	(2,1-5,2)	324	9 ⁺	2,8	(0,9-4,7)	438	19 ⁺	4,3	(2,3-6,4)
Aracaju	593	23 ⁺	3,9	(2,3-5,5)	243	11 ⁺	4,5	(2,0-7,1)	350	12 ⁺	3,4	(1,5-5,3)
Belo Horizonte	1692	78	4,6	(3,6-5,6)	727	29 ⁺	4,0	(2,5-5,5)	965	49 ⁺	5,1	(3,6-6,5)
Vitória	567	37 ⁺	6,5	(4,4-8,7)	250	15 ⁺	6,0	(3,0-9,0)	317	22 ⁺	6,9	(4,2-9,7)
Rio de Janeiro	2155	129	6,0	(5,0-7,0)	862	46 ⁺	5,3	(3,7-6,9)	1293	83	6,4	(5,0-7,8)
São Paulo	884	37 ⁺	4,2	(2,9-5,5)	371	17 ⁺	4,6	(2,2-7,0)	513	20 ⁺	3,9	(2,3-5,5)
Curitiba	1775	71	4,0	(3,1-4,9)	785	33 ⁺	4,2	(2,7-5,7)	990	38 ⁺	3,8	(2,7-5,0)
Florianópolis	657	32 ⁺	4,9	(3,3-6,5)	288	16 ⁺	5,6	(3,3-7,8)	369	16 ⁺	4,3	(2,1-6,5)
Porto Alegre	1075	72	6,7	(5,2-8,2)	465	27 ⁺	5,8	(3,8-7,8)	610	45 ⁺	7,4	(5,0-9,8)
Campo Grande	491	27 ⁺	5,5	(3,2-7,8)	208	13 ⁺	6,3	(3,0-9,5)	283	14 ⁺	4,9	(2,3-7,6)
Distrito Federal	1397	49 ⁺	3,5	(2,5-4,5)	616	14 ⁺	2,3	(1,1-3,5)	781	35 ⁺	4,5	(2,9-6,1)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter diagnóstico clínico de doenças isquêmicas do coração nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 13.2. Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de infarto ou ataque do coração ou angina ou doenças das coronárias, na população de estudo de 25 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	25 a 39 anos				40 a 59 anos				60 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	630	15 ⁺	2,4	(1,2-3,5)	396	21 ⁺	5,3	(3,3-7,3)	142	12 ⁺	8,5	(3,2-13,7)
Belém	476	4 ⁺	0,8	(0,1-1,6)	358	10 ⁺	2,8	(1,3-4,3)	145	14 ⁺	9,7	(4,3-15,0)
Palmas	498	8 ⁺	1,6	(0,6-2,6)	266	13 ⁺	4,9	(2,5-7,3)	47 ⁺	8 ⁺	17,0	(3,9-30,1)
São Luís	619	7 ⁺	1,1	(0,3-1,9)	405	7 ⁺	1,7	(0,5-3,0)	135	6 ⁺	4,4	(1,3-7,6)
Fortaleza	761	9 ⁺	1,2	(0,5-1,9)	588	18 ⁺	3,1	(1,8-4,3)	270	27 ⁺	10,0	(6,0-14,0)
Natal	267	9 ⁺	3,4	(1,4-5,4)	208	10 ⁺	4,8	(2,2-7,4)	95	12 ⁺	12,6	(6,1-19,2)
João Pessoa	422	4 ⁺	0,9	(0,0-1,9)	324	8 ⁺	2,5	(0,5-4,4)	140	16 ⁺	11,4	(5,5-17,3)
Recife	301	3 ⁺	1,0	(0,0-2,1)	314	9 ⁺	2,9	(0,9-4,8)	147	16 ⁺	10,9	(5,4-16,4)
Aracaju	294	4 ⁺	1,4	(0,1-2,6)	216	11 ⁺	5,1	(2,1-8,0)	83	8 ⁺	9,6	(2,7-16,6)
Belo Horizonte	794	9 ⁺	1,1	(0,4-1,8)	629	35 ⁺	5,6	(4,0-7,2)	269	34 ⁺	12,6	(8,5-16,7)
Vitória	224	2 ⁺	0,9	(0,0-2,1)	260	18 ⁺	6,9	(3,8-10,1)	83	17 ⁺	20,5	(13,1-27,9)
Rio de Janeiro	760	6 ⁺	0,8	(0,2-1,4)	935	58	6,2	(4,4-8,0)	460	65	14,1	(11,1-17,2)
São Paulo	394	5 ⁺	1,3	(0,2-2,3)	372	18 ⁺	4,8	(2,7-7,0)	118	14 ⁺	11,9	(6,1-17,6)
Curitiba	836	13 ⁺	1,6	(0,7-2,4)	697	28 ⁺	4,0	(2,7-5,3)	242	30 ⁺	12,4	(8,6-16,2)
Florianópolis	258	3 ⁺	1,2	(0,0-2,4)	287	13 ⁺	4,5	(2,4-6,7)	112	16 ⁺	14,3	(7,9-20,7)
Porto Alegre	392	7 ⁺	1,8	(0,6-3,0)	447	32 ⁺	7,2	(4,1-10,3)	236	33 ⁺	14,0	(9,7-18,3)
Campo Grande	206	3 ⁺	1,5	(0,0-3,1)	216	12 ⁺	5,6	(2,0-9,1)	69	12 ⁺	17,4	(8,7-26,1)
Distrito Federal	718	6 ⁺	0,8	(0,2-1,5)	525	22 ⁺	4,2	(2,6-5,7)	154	21 ⁺	13,6	(7,4-19,9)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter diagnóstico clínico de doenças isquêmicas do coração nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 13.3. Percentual de indivíduos que referiram ter diagnóstico clínico de infarto ou ataque do coração ou angina ou doenças das coronárias, na população de estudo de 25 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	533	33 ⁺	6,2	(4,4-8,0)	623	15 ⁺	2,4	(1,3-3,5)
Belém	406	12 ⁺	3,0	(1,3-4,6)	569	16 ⁺	2,8	(1,6-4,0)
Palmas	311	15 ⁺	4,8	(2,7-7,0)	482	12 ⁺	2,5	(1,0-4,0)
São Luís	426	9 ⁺	2,1	(0,9-3,3)	726	11 ⁺	1,5	(0,7-2,3)
Fortaleza	760	24 ⁺	3,2	(1,8-4,5)	834	28 ⁺	3,4	(2,0-4,7)
Natal	284	16 ⁺	5,6	(2,6-8,7)	268	14 ⁺	5,2	(2,6-7,8)
João Pessoa	420	20 ⁺	4,8	(2,7-6,8)	458	8 ⁺	1,7	(0,6-2,9)
Recife	337	18 ⁺	5,3	(2,7-8,0)	386	9 ⁺	2,3	(0,6-4,1)
Aracaju	264	14 ⁺	5,3	(2,7-7,9)	314	8 ⁺	2,5	(0,9-4,2)
Belo Horizonte	783	48 ⁺	6,1	(4,4-7,9)	871	29 ⁺	3,3	(2,1-4,5)
Vitória	158	25 ⁺	15,8	(9,9-21,8)	397	12 ⁺	3,0	(1,5-4,5)
Rio de Janeiro	676	59	8,7	(6,5-11)	1424	65	4,6	(3,5-5,6)
São Paulo	394	22 ⁺	5,6	(3,4-7,7)	455	14 ⁺	3,1	(1,5-4,6)
Curitiba	628	37 ⁺	5,9	(4,1-7,7)	1051	30 ⁺	2,9	(1,9-3,8)
Florianópolis	228	19 ⁺	8,3	(4,7-12)	409	11 ⁺	2,7	(1,3-4,1)
Porto Alegre	359	36 ⁺	10,0	(7,4-12,7)	700	35 ⁺	5,0	(3,2-6,8)
Campo Grande	206	19 ⁺	9,2	(5,1-13,4)	258	8 ⁺	3,1	(1,0-5,2)
Distrito Federal	525	30 ⁺	5,7	(3,7-7,7)	847	19 ⁺	2,2	(1,2-3,3)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter diagnóstico clínico de doenças isquêmicas do coração nesta capital e neste grupo é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 14.1. Percentual de indivíduos que, em comparação com pessoas de sua idade, consideraram o seu próprio estado de saúde regular ou ruim, na população de estudo de 15 anos ou mais, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1702	528	31,0	(28,2-33,8)	765	174	22,7	(19,5-26,0)	937	354	37,8	(34,1-41,4)
Belém	1410	506	36,0	(32,5-39,4)	599	188	31,5	(27,2-35,8)	811	318	39,3	(35,0-43,5)
Palmas	1233	329	26,7	(21,8-31,6)	600	139	23,2	(18,0-28,3)	633	190	30,0	(23,8-36,2)
São Luís	1728	602	34,8	(31,1-38,6)	750	236	31,5	(26,8-36,1)	978	366	37,4	(33,4-41,5)
Fortaleza	2266	627	27,7	(25,2-30,3)	1000	228	22,8	(19,9-25,7)	1266	399	31,6	(28,2-35,0)
Natal	810	251	31,1	(27,1-35,0)	352	88	25,1	(20,7-29,5)	458	163	35,7	(30,7-40,6)
João Pessoa	1205	322	26,7	(22,8-30,6)	490	100	20,4	(16,2-24,6)	715	222	31,0	(26,0-36,1)
Recife	1010	327	32,4	(28,3-36,4)	434	115	26,5	(21,5-31,5)	576	212	36,8	(31,7-41,9)
Aracaju	842	276	32,8	(28,3-37,3)	354	93	26,3	(20,5-32,2)	488	183	37,5	(32,4-42,6)
Belo Horizonte	2255	439	19,5	(17,0-21,9)	985	160	16,2	(13,6-18,9)	1270	279	22,0	(18,8-25,2)
Vitória	766	179	23,4	(18,6-28,1)	352	70	19,9	(14,4-25,4)	414	109	26,3	(20,8-31,9)
Rio de Janeiro	2692	690	25,6	(23,5-27,7)	1096	206	18,8	(16,2-21,4)	1596	484	30,3	(27,8-32,9)
São Paulo	1210	296	24,5	(21,8-27,1)	524	108	20,6	(17,4-23,8)	686	188	27,4	(23,9-30,9)
Curitiba	2337	460	19,7	(17,7-21,7)	1045	180	17,2	(14,7-19,8)	1292	280	21,7	(19,3-24,1)
Florianópolis	851	182	21,4	(18,3-24,5)	379	67	17,7	(13,9-21,5)	472	115	24,4	(20,5-28,4)
Porto Alegre	1395	256	18,4	(15,9-20,8)	618	101	16,3	(13,0-19,7)	777	155	20,0	(16,8-23,2)
Campo Grande	697	134	19,2	(15,2-23,2)	308	60	19,5	(14,8-24,2)	389	74	19,0	(14,4-23,7)
Distrito Federal	1994	578	29,0	(25,3-32,7)	865	211	24,4	(20,9-28,0)	1129	367	32,5	(27,5-37,5)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela 14.2. Percentual de indivíduos que, em comparação com pessoas de sua idade, consideraram o seu próprio estado de saúde regular ou ruim, na população de estudo de 15 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	15 a 24 anos				25 a 49 anos				50 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	534	132	24,7	(20,9-28,5)	902	264	29,3	(25,2-33,3)	266	132	49,6	(42,5-56,8)
Belém	431	138	32,1	(27,3-36,9)	708	244	34,6	(30,2-38,9)	271	124	45,8	(39,3-52,3)
Palmas	423	101	23,9	(17,1-30,6)	687	177	25,8	(20,6-31,0)	123	51	41,5	(30,9-52,1)
São Luís	573	142	24,8	(20,5-29,1)	875	314	35,9	(31,4-40,4)	280	146	52,1	(44,5-59,8)
Fortaleza	647	138	21,4	(18,0-24,8)	1115	275	24,7	(21,6-27,7)	504	214	42,5	(37,4-47,7)
Natal	240	44 ⁺	18,3	(12,9-23,8)	396	118	29,8	(25,2-34,4)	174	89	51,7	(44,6-58,9)
João Pessoa	319	46 ⁺	14,4	(10,0-18,9)	619	160	25,8	(20,3-31,4)	267	116	43,4	(36,1-50,8)
Recife	248	61	24,6	(18,3-30,9)	495	152	30,7	(25,9-35,5)	267	114	42,7	(35,1-50,3)
Aracaju	249	68	27,4	(21,1-33,8)	428	132	30,8	(25,4-36,3)	165	76	46,1	(37,4-54,7)
Belo Horizonte	563	77	13,7	(10,2-17,1)	1187	221	18,6	(15,8-21,5)	505	141	28,0	(22,9-33,0)
Vitória	199	35 ⁺	17,6	(12,2-23,0)	377	86	22,8	(16,9-28,7)	190	58	30,5	(22,2-38,8)
Rio de Janeiro	537	92	17,1	(13,5-20,8)	1302	300	23,0	(20,2-25,8)	853	298	34,9	(31,3-38,6)
São Paulo	326	52	16,0	(11,8-20,1)	613	147	24,0	(20,0-28,0)	271	97	35,8	(30,1-41,5)
Curitiba	562	77	13,7	(10,5-16,9)	1266	212	16,8	(14,5-19,0)	509	171	33,6	(28,3-38,9)
Florianópolis	194	26 ⁺	13,4	(8,9-17,9)	414	74	17,9	(13,6-22,3)	243	82	33,7	(27,7-39,8)
Porto Alegre	320	35 ⁺	10,9	(7,2-14,7)	662	123	18,6	(15,1-22,0)	413	98	23,8	(19,0-28,7)
Campo Grande	206	24 ⁺	11,7	(7,8-15,5)	332	54	16,3	(10,8-21,7)	159	56	35,2	(26,5-44,0)
Distrito Federal	597	130	21,8	(16,3-27,3)	1040	280	26,9	(23,2-30,7)	357	168	47,2	(39,6-54,8)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que auto-avaliaram seu estado de saúde como regular ou ruim nesta capital e neste grupo, é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 14.3. Percentual de indivíduos que, em comparação com pessoas de sua idade, consideraram o seu próprio estado de saúde regular ou ruim, na população de estudo de 15 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	731	306	41,9	(38,5-45,3)	958	216	22,5	(19,4-25,7)
Belém	566	242	42,8	(38,0-47,7)	839	262	31,3	(27,5-35,1)
Palmas	393	158	40,2	(35,0-45,4)	819	167	20,4	(15,2-25,6)
São Luís	557	266	47,8	(42,6-52,9)	1163	335	28,8	(25,5-32,1)
Fortaleza	981	381	38,9	(35,5-42,3)	1258	242	19,3	(17,1-21,5)
Natal	383	158	41,4	(36,2-46,5)	400	84	21,0	(16,6-25,4)
João Pessoa	555	203	36,6	(32,5-40,7)	642	117	18,2	(14,3-22,1)
Recife	427	187	43,8	(39,3-48,3)	541	123	22,7	(18,3-27,1)
Aracaju	360	153	42,6	(37,6-47,6)	467	118	25,3	(20,3-30,2)
Belo Horizonte	915	273	29,9	(26,0-33,7)	1297	160	12,3	(10,1-14,6)
Vitória	196	85	43,4	(35,1-51,7)	554	90	16,2	(12,1-20,4)
Rio de Janeiro	789	312	39,5	(36,2-42,9)	1844	360	19,5	(17,5-21,5)
São Paulo	452	166	36,7	(32,2-41,3)	722	122	16,9	(14,1-19,7)
Curitiba	737	229	31,1	(27,1-35,0)	1496	205	13,7	(12,1-15,3)
Florianópolis	264	97	36,7	(30,5-43,0)	559	77	13,8	(10,9-16,7)
Porto Alegre	426	142	33,4	(29,4-37,4)	952	113	11,9	(9,9-13,9)
Campo Grande	256	76	29,7	(23,4-36,0)	409	47 ⁺	11,5	(8,2-14,8)
Distrito Federal	707	316	44,8	(40,5-49,0)	1258	254	20,2	(16,8-23,6)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que auto-avaliaram seu estado de saúde como regular ou ruim nesta capital e neste grupo, é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 14.4. Percentual de indivíduos que referiram ter limitação ou dificuldade para fazer as suas atividades habituais por causa de algum problema de saúde ou incapacitação, na população de estudo de 15 anos ou mais, por sexo e total, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total				Sexo							
					Masculino				Feminino			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	1702	233	13,7	(11,8-15,6)	765	88	11,5	(8,8-14,2)	937	145	15,5	(13,0-18,0)
Belém	1410	255	18,1	(15,3-20,8)	599	74	12,4	(9,9-14,8)	811	181	22,3	(18,9-25,8)
Palmas	1234	185	15,0	(11,7-18,2)	601	79	13,1	(9,6-16,6)	633	106	16,7	(12,4-21,1)
São Luís	1733	211	12,2	(10,5-13,9)	754	60	8,0	(5,9-10,0)	979	151	15,4	(12,9-17,9)
Fortaleza	2266	366	16,2	(14,2-18,1)	1000	102	10,2	(8,2-12,2)	1266	264	20,9	(18,2-23,5)
Natal	810	127	15,7	(13,0-18,4)	352	35 ⁺	9,9	(6,7-13,2)	458	92	20,1	(16,0-24,2)
João Pessoa	1205	93	7,7	(5,0-10,5)	490	27 ⁺	5,5	(3,2-7,8)	715	66	9,2	(5,6-12,9)
Recife	1010	155	15,3	(13,1-17,6)	434	45 ⁺	10,4	(7,5-13,3)	576	110	19,1	(16,1-22,1)
Aracaju	842	123	14,6	(11,2-18,1)	354	36 ⁺	10,2	(6,8-13,6)	488	87	17,8	(13,2-22,5)
Belo Horizonte	2253	278	12,3	(10,5-14,2)	983	77	7,8	(6,1-9,6)	1270	201	15,8	(13,1-18,5)
Vitória	766	88	11,5	(9,1-13,9)	352	24 ⁺	6,8	(3,6-10,0)	414	64	15,5	(12,1-18,8)
Rio de Janeiro	2692	302	11,2	(10,1-12,3)	1096	88	8,0	(6,4-9,7)	1596	214	13,4	(11,9-14,9)
São Paulo	1209	148	12,2	(10,2-14,3)	523	39 ⁺	7,5	(5,2-9,7)	686	109	15,9	(12,9-18,9)
Curitiba	2336	296	12,7	(11,2-14,1)	1044	106	10,2	(8,3-12,0)	1292	190	14,7	(12,7-16,7)
Florianópolis	851	151	17,7	(14,3-21,2)	379	40 ⁺	10,6	(7,4-13,7)	472	111	23,5	(18,3-28,7)
Porto Alegre	1395	264	18,9	(16,4-21,4)	618	91	14,7	(11,3-18,1)	777	173	22,3	(19,3-25,3)
Campo Grande	697	109	15,6	(12,6-18,6)	308	41 ⁺	13,3	(9,4-17,3)	389	68	17,5	(13,2-21,8)
Distrito Federal	1994	289	14,5	(12,6-16,4)	865	81	9,4	(7,3-11,4)	1129	208	18,4	(15,6-21,2)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter limitação ou dificuldade para fazer as suas atividades habituais por causa de algum problema de saúde ou incapacitação nesta capital e neste grupo, é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 14.5. Percentual de indivíduos que referiram ter limitação ou dificuldade para fazer as suas atividades habituais por causa de algum problema de saúde ou incapacitação, na população de estudo de 15 anos ou mais, por faixa etária, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Faixa etária											
	15 a 24 anos				25 a 49 anos				50 anos e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	534	56	10,5	(7,7-13,2)	902	113	12,5	(10,6-14,5)	266	64	24,1	(17,0-31,1)
Belém	431	52	12,1	(8,6-15,5)	708	123	17,4	(14,0-20,8)	271	80	29,5	(23,6-35,4)
Palmas	423	46	10,9	(7,5-14,3)	687	99	14,4	(10,9-18,0)	124	40 ⁺	32,3	(24,1-40,5)
São Luís	574	41 ⁺	7,1	(5,4-8,9)	877	108	12,3	(10,1-14,5)	282	62	22,0	(16,2-27,8)
Fortaleza	647	48 ⁺	7,4	(5,2-9,7)	1115	184	16,5	(14,1-18,9)	504	134	26,6	(22,9-30,3)
Natal	240	18 ⁺	7,5	(3,8-11,2)	396	56	14,1	(10,5-17,7)	174	53	30,5	(24,2-36,7)
João Pessoa	319	7 ⁺	2,2	(0,4-4,0)	619	42 ⁺	6,8	(3,6-9,9)	267	44 ⁺	16,5	(10,1-22,9)
Recife	248	17 ⁺	6,9	(3,1-10,6)	495	57	11,5	(8,8-14,2)	267	81	30,3	(24,1-36,5)
Aracaju	249	19 ⁺	7,6	(4,3-11,0)	428	66	15,4	(11,3-19,5)	165	38 ⁺	23,0	(15,8-30,3)
Belo Horizonte	563	26 ⁺	4,6	(2,8-6,5)	1186	125	10,5	(8,3-12,7)	504	127	25,2	(20,5-29,9)
Vitória	199	14 ⁺	7,0	(3,6-10,4)	377	43 ⁺	11,4	(7,8-15,1)	190	31 ⁺	16,3	(11,0-21,6)
Rio de Janeiro	537	22 ⁺	4,1	(2,5-5,7)	1302	115	8,8	(7,3-10,4)	853	165	19,3	(16,9-21,8)
São Paulo	326	18 ⁺	5,5	(2,9-8,2)	612	69	11,3	(8,6-13,9)	271	61	22,5	(16,9-28,1)
Curitiba	561	41 ⁺	7,3	(5,1-9,5)	1266	127	10,0	(8,3-11,7)	509	128	25,2	(21,7-28,6)
Florianópolis	194	16 ⁺	8,2	(4,1-12,4)	414	65	15,7	(11,3-20,1)	243	70	28,8	(23,0-34,6)
Porto Alegre	320	34 ⁺	10,6	(7,4-13,9)	662	109	16,5	(13,4-19,5)	413	121	29,3	(23,8-34,8)
Campo Grande	206	23 ⁺	11,2	(6,9-15,5)	332	42 ⁺	12,7	(8,6-16,7)	159	44 ⁺	27,7	(19,9-35,4)
Distrito Federal	597	41 ⁺	6,9	(4,6-9,1)	1040	155	14,9	(12,2-17,6)	357	93	26,1	(21,6-30,5)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter limitação ou dificuldade para fazer as suas atividades habituais por causa de algum problema de saúde ou incapacitação nesta capital e neste grupo, é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela 14.6. Percentual de indivíduos que referiram ter limitação ou dificuldade para fazer as suas atividades habituais por causa de algum problema de saúde ou incapacitação, na população de estudo de 15 anos ou mais, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Escolaridade - Ensino fundamental							
	incompleto				completo e mais			
	Total	n	%	IC _{95%}	Total	n	%	IC _{95%}
Manaus	731	116	15,9	(12,7-19,1)	958	117	12,2	(9,8-14,7)
Belém	566	125	22,1	(17,7-26,5)	839	128	15,3	(12,2-18,3)
Palmas	394	87	22,1	(16,9-27,3)	819	96	11,7	(8,9-14,5)
São Luís	562	103	18,3	(15,0-21,6)	1163	107	9,2	(7,5-10,9)
Fortaleza	981	197	20,1	(17,0-23,2)	1258	162	12,9	(11,1-14,7)
Natal	383	73	19,1	(15,0-23,1)	400	45 ⁺	11,3	(8,1-14,4)
João Pessoa	555	64	11,5	(7,1-16,0)	642	28 ⁺	4,4	(2,3-6,4)
Recife	427	92	21,5	(17,6-25,5)	541	58	10,7	(8,1-13,3)
Aracaju	360	64	17,8	(12,4-23,1)	467	58	12,4	(8,9-15,9)
Belo Horizonte	914	162	17,7	(15,2-20,3)	1296	109	8,4	(6,7-10,1)
Vitória	196	31 ⁺	15,8	(10,9-20,7)	554	55	9,9	(7,2-12,7)
Rio de Janeiro	789	117	14,8	(12,5-17,1)	1844	171	9,3	(8,0-10,5)
São Paulo	451	73	16,2	(12,6-19,7)	722	72	10,0	(7,8-12,1)
Curitiba	736	125	17,0	(14,3-19,7)	1496	154	10,3	(8,6-11,9)
Florianópolis	264	66	25,0	(19,2-30,8)	559	76	13,6	(9,8-17,4)
Porto Alegre	426	126	29,6	(24,5-34,6)	952	137	14,4	(12,0-16,8)
Campo Grande	256	56	21,9	(16,6-27,1)	409	46 ⁺	11,2	(7,6-14,9)
Distrito Federal	707	125	17,7	(14,9-20,4)	1258	154	12,2	(9,8-14,7)

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Nota: + O número de entrevistados que referiram ter limitação ou dificuldade para fazer as suas atividades habituais por causa de algum problema de saúde ou incapacitação nesta capital e neste grupo, é inferior a 50; portanto, recomendamos cautela na interpretação dos resultados.

Tabela A.1. Distribuição do número de setores, domicílios particulares e pessoas residentes na amostra e no Censo Demográfico 2000, por capital pesquisada

Capital	Setores na amostra	Domicílios particulares			Domicílios particulares ocupados		Pessoas residentes				Fração global de amostragem
		Censo	Esperados por setor	Esperados por amostra	Censo	Esperados por amostra	Total		15 anos ou mais		
							Censo	Esperados por amostra	Censo	Esperados por amostra	
Manaus	40	386218	20	800	328028	680	1405835	2910	936878	2448	1/482
Belém	59	350056	12	708	297111	602	1280614	2593	914860	2065	1/494
Palmas	30	43421	16	480	35523	393	137355	1516	92168	1178	1/91
São Luís	49	240937	14	686	202537	577	870028	2473	605456	1655	1/351
Fortaleza	60	617212	16	960	527340	820	2141402	2908	1511790	2461	1/644
Natal	50	209596	8	400	177579	339	712317	1352	510990	1016	1/524
João Pessoa	45	176951	14	630	151954	541	597934	2110	432502	1623	1/281
Recife	64	426194	7	448	377068	396	1422905	1494	1050665	1189	1/951
Aracaju	40	143354	10	400	116917	328	461534	1292	333667	984	1/356
Belo Horizonte	80	734554	14	1120	628885	963	2238526	3419	1695005	2697	1/653
Vitória	40	100876	11	440	85810	374	292304	1272	221420	935	1/229
Rio de Janeiro	85	2127853	20	1700	1807940	1445	5857904	3954	4534322	3613	1/1251
São Paulo	100	3551302	6	600	2992656	506	10434252	1754	7841423	1416	1/5919
Curitiba	102	541566	10 ou 15	1295	472232	1146	1587315	4410	1192393	2635	1/412
Florianópolis	45	141127	12	540	103907	398	342315	1308	260594	994	1/261
Porto Alegre	65	502865	14	910	441828	800	1360590	2455	1046945	1839	1/553
Campo Grande	45	217314	8	360	186276	309	663621	1099	474829	926	1/604
Distrito Federal	49	630645	20	980	548527	852	2051146	3171	1468067	2557	1/644
Total	1048	11142041	-	13457	9482118	11469	33857897	41490	25123974	32231	-

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS. IBGE-Censo Demográfico 2000.

Tabela A.2. Distribuição da amostra de domicílios, por situação, no estudo, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de domicílios selecionados	Entrevista realizada		Entrevista não realizada					
				Unidade ocupada		Unidade vaga		Unidade inexistente	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Manaus	780	673	86,3	37	4,7	55	7,1	15	1,9
Belém	717	556	77,5	68	9,5	72	10,0	21	2,9
Palmas	562	509	90,6	7	1,2	45	8,0	1	0,2
São Luís	715	642	89,8	13	1,8	51	7,1	9	1,3
Fortaleza	1021	876	85,8	42	4,1	85	8,3	18	1,8
Natal	401	333	83,0	16	4,0	37	9,2	15	3,7
João Pessoa	661	533	80,6	33	5,0	82	12,4	13	2,0
Recife	457	416	91,0	13	2,8	25	5,5	3	0,7
Aracaju	424	344	81,1	29	6,8	33	7,8	18	4,2
Belo Horizonte	1214	995	82,0	74	6,1	125	10,3	20	1,6
Vitória	445	340	76,4	44	9,9	47	10,6	14	3,1
Rio de Janeiro	1716	1331	77,6	217	12,6	162	9,4	6	0,3
São Paulo	652	523	80,2	67	10,3	48	7,4	14	2,1
Curitiba	1317	1030	78,2	124	9,4	105	8,0	58	4,4
Florianópolis	568	390	68,7	64	11,3	96	16,9	18	3,2
Porto Alegre	889	675	75,9	124	13,9	73	8,2	17	1,9
Campo Grande	365	309	84,7	17	4,7	33	9,0	6	1,6
Distrito Federal	981	848	86,4	63	6,4	48	4,9	22	2,2
Total	13885	11323	81,5	1052	7,6	1222	8,8	288	2,1

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela A.3. Distribuição de entrevistas não realizadas, por tipo, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de domicílios selecionados	Entrevista não realizada																			
		Unidade ocupada						Unidade vaga						Unidade inexistente							
		Fechada		Recusa		Outra		Em condição de ser habitada		Uso ocasional		Em construção ou reforma		Em ruínas		Demolidas		Não foi encontrada		Não residencial	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Manaus	780	23	2,9	9	1,2	5	0,6	39	5,0	7	0,9	5	0,6	4	0,5	1	0,1	4	0,5	10	1,3
Belém	717	27	3,8	30	4,2	11	1,5	42	5,9	20	2,8	6	0,8	4	0,6	3	0,4	9	1,3	9	1,3
Palmas	562	0	0,0	6	1,1	1	0,2	35	6,2	5	0,9	3	0,5	2	0,4	0	0,0	1	0,2	0	0,0
São Luís	715	5	0,7	7	1,0	1	0,1	29	4,1	11	1,5	6	0,8	5	0,7	1	0,1	0	0,0	8	1,1
Fortaleza	1021	23	2,3	17	1,7	2	0,2	66	6,5	11	1,1	5	0,5	3	0,3	0	0,0	2	0,2	16	1,6
Natal	401	5	1,2	11	2,7	0	0,0	21	5,2	14	3,5	2	0,5	0	0,0	6	1,5	0	0,0	9	2,2
João Pessoa	661	19	2,9	12	1,8	2	0,3	71	10,7	7	1,1	4	0,6	0	0,0	3	0,5	0	0,0	10	1,5
Recife	457	1	0,2	6	1,3	6	1,3	16	3,5	7	1,5	2	0,4	0	0,0	1	0,2	0	0,0	2	0,4
Aracaju	424	5	1,2	18	4,2	6	1,4	20	4,7	4	0,9	5	1,2	4	0,9	1	0,2	5	1,2	12	2,8
Belo Horizonte	1214	17	1,4	48	4,0	9	0,7	90	7,4	17	1,4	17	1,4	1	0,1	1	0,1	0	0,0	19	1,6
Vitória	445	19	4,3	18	4,0	7	1,6	33	7,4	10	2,2	4	0,9	0	0,0	1	0,2	9	2,0	4	0,9
Rio de Janeiro	1716	51	3,0	153	8,9	13	0,8	105	6,1	48	2,8	7	0,4	2	0,1	3	0,2	0	0,0	3	0,2
São Paulo	652	7	1,1	57	8,7	3	0,5	34	5,2	10	1,5	4	0,6	0	0,0	0	0,0	6	0,9	8	1,2
Curitiba	1317	10	0,8	86	6,5	28	2,1	74	5,6	11	0,8	17	1,3	3	0,2	6	0,5	21	1,6	31	2,4
Florianópolis	568	18	3,2	42	7,4	4	0,7	31	5,5	58	10,2	5	0,9	2	0,4	5	0,9	8	1,4	5	0,9
Porto Alegre	889	33	3,7	87	9,8	4	0,4	54	6,1	15	1,7	4	0,4	0	0,0	1	0,1	2	0,2	14	1,6
Campo Grande	365	4	1,1	13	3,6	0	0,0	20	5,5	7	1,9	5	1,4	1	0,3	1	0,3	1	0,3	4	1,1
Distrito Federal	981	22	2,2	33	3,4	8	0,8	34	3,5	7	0,7	7	0,7	0	0,0	5	0,5	13	1,3	4	0,4
Total	13885	289	2,1	653	4,7	110	0,8	814	5,9	269	1,9	108	0,8	31	0,2	39	0,3	81	0,6	168	1,2

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela A.4. Distribuição da amostra de indivíduos, por tipo de entrevista, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de moradores de 15 anos ou mais	Entrevista realizada				Entrevista não realizada							
		Totalmente		Parcialmente		Ausente		Recusa		Doente		Outro	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Manaus	1833	1697	92,6	7	0,4	58	3,2	32	1,7	25	1,4	14	0,8
Belém	1603	1407	87,8	3	0,2	95	5,9	57	3,6	34	2,1	7	0,4
Palmas	1326	1233	93,0	1	0,1	49	3,7	28	2,1	6	0,4	9	0,7
São Luís	1790	1731	96,7	2	0,1	26	1,5	11	0,6	4	0,2	16	0,9
Fortaleza	2410	2262	93,9	5	0,2	39	1,6	58	2,4	33	1,4	13	0,5
Natal	918	808	88,0	2	0,2	43	4,7	36	3,9	26	2,8	3	0,3
João Pessoa	1297	1203	92,8	2	0,2	46	3,5	19	1,5	18	1,4	9	0,7
Recife	1098	1009	91,9	3	0,3	13	1,2	31	2,8	20	1,8	22	2,0
Aracaju	944	841	89,1	3	0,3	43	4,6	34	3,6	12	1,3	11	1,2
Belo Horizonte	2492	2243	90,0	12	0,5	42	1,7	101	4,1	34	1,4	60	2,4
Vitória	861	764	88,7	6	0,7	34	3,9	43	5,0	9	1,0	5	0,6
Rio de Janeiro	3203	2686	83,9	6	0,2	160	5,0	171	5,3	61	1,9	119	3,7
São Paulo	1345	1205	89,6	6	0,4	26	1,9	93	6,9	10	0,7	5	0,4
Curitiba	2522	2336	92,6	1	0,0	35	1,4	81	3,2	40	1,6	29	1,1
Florianópolis	947	845	89,2	6	0,6	27	2,9	49	5,2	16	1,7	4	0,4
Porto Alegre	1564	1388	88,7	8	0,5	57	3,6	89	5,7	7	0,4	15	1,0
Campo Grande	750	695	92,7	2	0,3	21	2,8	20	2,7	11	1,5	1	0,1
Distrito Federal	2216	1990	89,8	6	0,3	144	6,5	45	2,0	16	0,7	15	0,7
Total	29119	26343	90,5	81	0,3	958	3,3	998	3,4	382	1,3	357	1,2

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela A.5. Distribuição da amostra de homens, por tipo de entrevista, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de moradores de 15 anos ou mais	Entrevista realizada				Entrevista não realizada							
		Totalmente		Parcialmente		Ausente		Recusa		Doente		Outro	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Manaus	852	764	89,7	2	0,2	42	4,9	24	2,8	12	1,4	8	0,9
Belém	721	597	82,8	2	0,3	69	9,6	36	5,0	14	1,9	3	0,4
Palmas	660	601	91,1	0	0,0	35	5,3	19	2,9	2	0,3	3	0,4
São Luís	793	753	95,0	1	0,1	22	2,8	6	0,8	2	0,3	9	1,1
Fortaleza	1095	999	91,2	2	0,2	29	2,6	39	3,6	20	1,8	6	0,5
Natal	419	352	84,0	0	0,0	32	7,6	20	4,8	13	3,1	2	0,5
João Pessoa	549	490	89,3	0	0,0	38	6,9	13	2,4	5	0,9	3	0,5
Recife	495	433	87,5	3	0,6	11	2,2	21	4,2	12	2,4	15	3,0
Aracaju	417	354	84,9	0	0,0	28	6,7	23	5,5	5	1,2	7	1,7
Belo Horizonte	1138	983	86,4	2	0,2	26	2,3	71	6,2	19	1,7	37	3,3
Vitória	407	352	86,5	2	0,5	24	5,9	22	5,4	6	1,5	1	0,2
Rio de Janeiro	1432	1095	76,5	1	0,1	102	7,1	120	8,4	31	2,2	83	5,8
São Paulo	611	522	85,4	3	0,5	23	3,8	59	9,7	4	0,7	0	0,0
Curitiba	1166	1044	89,5	1	0,1	25	2,1	57	4,9	24	2,1	15	1,3
Florianópolis	440	379	86,1	0	0,0	20	4,5	30	6,8	9	2,0	2	0,5
Porto Alegre	732	616	84,2	3	0,4	36	4,9	62	8,5	4	0,5	11	1,5
Campo Grande	340	308	90,6	0	0,0	14	4,1	10	2,9	8	2,4	0	0,0
Distrito Federal	1012	865	85,5	1	0,1	105	10,4	28	2,8	5	0,5	8	0,8
Total	13279	11507	86,7	23	0,2	681	5,1	660	5,0	195	1,5	213	1,6

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela A.6. Distribuição da amostra de mulheres, por tipo de entrevista, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Total de moradores de 15 anos ou mais	Entrevista realizada				Entrevista não realizada								
		Totalmente		Parcialmente		Ausente		Recusa		Doente		Outro		
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Manaus	981	933	95,1	5	0,5	16	1,6	8	0,8	13	1,3	6	0,6	
Belém	882	810	91,8	1	0,1	26	2,9	21	2,4	20	2,3	4	0,5	
Palmas	666	632	94,9	1	0,2	14	2,1	#	9	1,3	4	0,6	6	0,9
São Luís	997	978	98,1	1	0,1	4	0,4	5	0,5	2	0,2	7	0,7	
Fortaleza	1315	1263	96,0	3	0,2	10	0,8	19	1,4	13	1,0	7	0,5	
Natal	499	457	91,6	1	0,2	11	2,2	16	3,2	13	2,6	1	0,2	
João Pessoa	748	713	95,3	2	0,3	8	1,1	6	0,8	13	1,7	6	0,8	
Recife	603	576	95,5	0	0,0	2	0,3	10	1,7	8	1,3	7	1,2	
Aracaju	527	487	92,4	3	0,6	15	2,8	11	2,1	7	1,3	4	0,8	
Belo Horizonte	1354	1260	93,1	10	0,7	16	1,2	30	2,2	15	1,1	23	1,7	
Vitória	454	412	90,7	4	0,9	10	2,2	21	4,6	3	0,7	4	0,9	
Rio de Janeiro	1771	1591	89,8	5	0,3	58	3,3	51	2,9	30	1,7	36	2,0	
São Paulo	734	681	92,8	5	0,7	3	0,4	34	4,6	6	0,8	5	0,7	
Curitiba	1356	1291	95,2	1	0,1	10	0,7	24	1,8	16	1,2	14	1,0	
Florianópolis	507	469	92,5	3	0,6	7	1,4	19	3,7	7	1,4	2	0,4	
Porto Alegre	832	772	92,8	5	0,6	21	2,5	27	3,2	3	0,4	4	0,5	
Campo Grande	410	386	94,1	3	0,7	7	1,7	10	2,4	3	0,7	1	0,2	
Distrito Federal	1204	1125	93,4	5	0,4	39	3,2	17	1,4	11	0,9	7	0,6	
Total	15840	14836	93,7	58	0,4	277	1,7	338	2,1	187	1,2	144	0,9	

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.

Tabela A.7. Distribuição da amostra de entrevistados e não entrevistados, por escolaridade, em 17 capitais brasileiras e DF, 2002 – 2005

Capital	Entrevistados por escolaridade – Ensino fundamental				Não entrevistados por escolaridade – Ensino fundamental			
	Incompleto		Completo e mais		Incompleto		Completo e mais	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Manaus	732	43,3	959	56,7	63	50,0	63	50,0
Belém	566	40,3	839	59,7	80	42,3	109	57,7
Palmas	394	32,5	819	67,5	37	40,2	55	59,8
São Luís	562	32,6	1163	67,4	30	53,6	26	46,4
Fortaleza	982	43,8	1258	56,2	55	40,1	82	59,9
Natal	383	48,9	400	51,1	58	56,9	44	43,1
João Pessoa	555	46,4	642	53,6	38	41,3	54	58,7
Recife	429	44,2	541	55,8	35	41,7	49	58,3
Aracaju	361	43,6	467	56,4	45	51,1	43	48,9
Belo Horizonte	915	41,4	1297	58,6	86	37,9	141	62,1
Vitória	198	26,3	556	73,7	17	21,8	61	78,2
Rio de Janeiro	789	30,0	1844	70,0	166	34,1	321	65,9
São Paulo	452	38,5	723	61,5	47	37,3	79	62,7
Curitiba	737	33,0	1496	67,0	74	42,8	99	57,2
Florianópolis	264	32,1	559	67,9	39	42,9	52	57,1
Porto Alegre	426	30,9	953	69,1	58	35,2	107	64,8
Campo Grande	256	38,5	409	61,5	18	37,5	30	62,5
Distrito Federal	707	35,9	1260	64,1	78	37,7	129	62,3
Total	9708	37,5	16185	62,5	1024	39,9	1544	60,1

Fonte: Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis, Conprev/INCA/MS.