

“Global Adult Tobacco Survey – GATS”: Relatório Final do Brasil


30 de agosto de 2010
Rio de Janeiro

Liz Maria de Almeida, MD, MPH, PhD
Divisão de Epidemiologia / CGTC
Instituto Nacional de Câncer
Brasil

Resultados regionais


Monitorar o uso do tabaco

USUÁRIOS DE TABACO FUMADO OU NÃO FUMADO, POR SEXO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES - 2008




Monitorar o uso do tabaco

USUÁRIOS DE **TABACO FUMADO** POR SEXO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES - 2008




Monitorar o uso do tabaco

USUÁRIOS DE TABACO FUMADO POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES - 2008




Monitorar o uso do tabaco

Usuários de tabaco fumado por sexo e grupos de idade e razão de prevalência por sexo (PR) em cada grupo de idade




Monitorar o uso do tabaco

USUÁRIOS DE TABACO FUMADO POR NÚMERO DE ANOS DE ESTUDO COMPLETOS E REGIÕES GEOGRÁFICAS – PETAB 2008




Monitorar o uso do tabaco

USUÁRIOS DE CIGARROS POR SEXO E REGIÃO GEOGRÁFICA PETAB 2008




Monitorar o uso do tabaco

Usuários diários de cigarros por sexo e região geográfica. PETab, 2008




Monitorar o uso do tabaco

% de JOVENS DE 15 A 24 ANOS COM GRAU DE DEPENDÊNCIA AO CIGARRO ELEVADO OU MUITO ELEVADO – PETAB 2008




Proteção à fumaça do tabaco

EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DE TABACO POR LOCAL PESQUISADO – PETAB 2008



Proteção à fumaça do tabaco


Exposição a fumaça do tabaco em locais de trabalho nos últimos 30 dias entre pessoas que trabalham em locais com ou sem áreas fechadas por estados brasileiros. PETab 2008



Cessação


Oferta do tratamento para parar de fumar

Fumantes que fizeram pelo menos uma tentativa para parar de fumar nos últimos 12 meses por sexo e região geográfica – PETab 2008




Oferta do tratamento para parar de fumar

FUMANTES QUE FORAM ACONSELHADOS A PARAR DE FUMAR POR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE NOS ÚLTIMOS 12 MESES POR SEXO E REGIÃO GEOGRÁFICA – PETAB 2008




Advertências sobre os riscos de fumar

INDIVÍDUOS QUE PERCEBERAM **INFORMAÇÃO ANTI-TABACO** EM ALGUM DOS **MEIOS DE COMUNICAÇÃO** PESQUISADOS POR SEXO E REGIÃO GEOGRÁFICA- PETAB 2008




Advertências sobre os riscos de fumar

PERCEPÇÃO DE PROPAGANDA ANTI-TABACO POR MEIO DE COMUNICAÇÃO E IDADE. PETAB 2008



Advertências sobre os riscos de fumar

FUMANTES QUE PENSARAM EM PARAR DE FUMAR DEPOIS DE OBSERVAR AS ADVERTÊNCIAS NOS MAÇOS DE CIGARROS EM ESTADOS BRASILEIROS. PETAB, 2008



Conhecimentos, crenças e atitudes

96,1% dos adultos acreditam que fumar causa doenças graves

94,7% dos adultos acredita que fumar causa **câncer de pulmão**

85,6% dos adultos acredita que fumar causa **infarto do miocárdio**

73,1% dos adultos acredita que fumar causa **derrame**

91,4% dos adultos acredita que fumar causa **doenças graves em não fumantes**

68,2% dos adultos acredita que usar **produtos de tabaco não fumados** (mascar fumo, aspirar rapé) causa doenças graves

Reforço da proibição da propaganda, promoção e patrocínio

Reforço da proibição da propaganda, promoção e patrocínio

INDIVÍDUOS QUE PERCEBERAM ALGUMA PROPAGANDA OU PROMOÇÃO DE CIGARROS OU PATROCÍNIO EM EVENTOS ESPORTIVOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA. PETAB 2008

